

عنوان درس: توانبخشی گروه های خاص

(۱۰۱۰) ۱) پیام توانبخشی از طریق چه کسی به سراسر جهان اعلام گردید؟

- ۱) راسک (۱۰۱۰) ۱
۲) کن راد (۱۰۱۰) ۲
۳) کسلر (۱۰۱۰) ۳
۴) پنیل (۱۰۱۰) ۴

(۱۰۱۰) ۲) طبقه بندی اختلالات روانی برای اولین بار توسط چه کسی ارائه شد؟

- ۱) فیلیپ پینل (۱۰۱۰) ۱
۲) چارکوت (۱۰۱۰) ۲
۳) فروید (۱۰۱۰) ۳
۴) امیل کروب لین (۱۰۱۰) ۴

(۱۰۱۰) ۳) فراهم نمودن شرایط ارتقا دانش و مهارت ها در قالب انتقال یافته ها و اطلاعات در کدام حیطه توانبخشی قرار دارد؟

- ۱) توانبخشی اجتماعی (۱۰۱۰) ۱
۲) توانبخشی حرفه ای (۱۰۱۰) ۲

- ۳) توانبخشی آموزشی (۱۰۱۰) ۳
۴) توانبخشی روانی (۱۰۱۰) ۴

(۱۰۱۰) ۴) فقدان فرصت ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران ناشی از چیست؟

- ۱) معلولیت (۱۰۱۰) ۱
۲) کم توانی (۱۰۱۰) ۲
۳) ناتوانی (۱۰۱۰) ۳
۴) نقص (۱۰۱۰) ۴

(۱۰۱۰) ۵) کدام بخش از ساختار دستگاه شنوایی به لحاظ پیچیدگی هایش اغلب لابیرنوت خوانده می شود؟

- ۱) گوش بیرونی (۱۰۱۰) ۱
۲) گوش درونی (۱۰۱۰) ۲
۳) لاله گوش (۱۰۱۰) ۳
۴) گوش میانی (۱۰۱۰) ۴

(۱۰۱۰) ۶) سیتومگالوویروس جزء کدام دسته از عوامل ایجاد نقص شنوایی می باشد؟

- ۱) عوامل پیش از تولد (۱۰۱۰) ۱
۲) عوامل پس از تولد (۱۰۱۰) ۲

- ۳) عوامل حین تولد (۱۰۱۰) ۳
۴) عوامل ارثی (۱۰۱۰) ۴

(۱۰۱۰) ۷) کدام نقص شنوایی غیر قابل برگشت است؟

- ۱) نقص شنوایی حسی - عصبی (۱۰۱۰) ۱
۲) نقص شنوایی آمیخته (۱۰۱۰) ۲

- ۳) نقص شنوایی مرکزی (۱۰۱۰) ۳
۴) نقص شنوایی انتقالی (۱۰۱۰) ۴

(۱۰۱۰) ۸) در کدام روش ارتباط سعی می شود باقی مانده شنوایی فرد را تقویت نموده و از طریق گفتار خوانی و تکلم برای رشد مهارت های ارتباطی استفاده نمود؟

- ۱) روش جامع (۱۰۱۰) ۱

- ۲) روش به کارگیری تقویت گننده ها (۱۰۱۰) ۲

- ۳) روش شنیداری - شفاهی (۱۰۱۰) ۳

- ۴) روش هجی کردن با انگشتان (۱۰۱۰) ۴

(۱۰۱۰)۹ کدام یک از موارد زیر یک لایه شفاف محافظت است که سمت داخلی پلک ها و روی سفیدی کره چشم را می پوشاند؟

(۱۰۱۰)۴ زجاجیه

(۱۰۱۰)۳ ملتحمه

(۱۰۱۰)۲ عنبیه

(۱۰۱۰)۱ قرنیه

(۱۰۱۰)۱۰ کدام یک از موارد زیر یک ساختمان شفاف در پشت عنبه است که در مرکز کردن دقیق پرتو های نور بر روی شبکیه به قرنیه کمک می کند؟

(۱۰۱۰)۴ اطاق قدامی

(۱۰۱۰)۳ شبکیه

(۱۰۱۰)۲ صلبیه

(۱۰۱۰)۱ عدسی

(۱۰۱۰)۱۱ علامت اولیه کدام بیماری چشم، احساس دیدن هاله ای در اطراف منبع نور است؟

(۱۰۱۰)۴ ماکولا

(۱۰۱۰)۳ آب سیاه

(۱۰۱۰)۲ تراخم

(۱۰۱۰)۱ لوچی

(۱۰۱۰)۱۲ استفاده از توپ های استیکار برای ارزیابی کدام یک از موارد زیر در کودکان کاربرد دارد؟

(۱۰۱۰)۲ دوربینی

(۱۰۱۰)۴ میدان دید

(۱۰۱۰)۱ نزدیک بینی

(۱۰۱۰)۳ تیزبینی

(۱۰۱۰)۱۳ کدام نوع معلولیت در کودکان دارای کلامی گرایی است؟

(۱۰۱۰)۴ نابینایی

(۱۰۱۰)۳ کم توان ذهنی

(۱۰۱۰)۲ پیش فعالی

(۱۰۱۰)۱ ناشنوایی

(۱۰۱۰)۱۴ در بحث سبب شناسی کم توان ذهنی آنوکسی مربوط به کدام یک از عوامل زیر است؟

(۱۰۱۰)۱ عوامل پیش از حاملگی

(۱۰۱۰)۲ عوامل حین تولد

(۱۰۱۰)۳ عوامل پس از تولد

(۱۰۱۰)۴ عوامل پیش از تولد

(۱۰۱۰)۱۵ کدام گروه ۸۰ درصد از افراد کم توان ذهنی را شامل می شود؟

(۱۰۱۰)۱ کم توان ذهنی خفیف

(۱۰۱۰)۲ کم توان ذهنی متوسط

(۱۰۱۰)۳ کم توان ذهنی شدید

(۱۰۱۰)۴ کم توان ذهنی عمیق

۱۶) کدام بیماری جزو اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد پرتوئینی است؟

(۱۰۱۰)۲ فنیل کتونوری

(۱۰۱۰)۱ صرع

(۱۰۱۰)۴ هیدروسفال

(۱۰۱۰)۳ سندروم داون

۱۷) تغییر شکل اندام های حرکتی به سمت طرفین چه نام دارد؟

(۱۰۱۰)۲ لوردوز

(۱۰۱۰)۱ پوکی استخوان

(۱۰۱۰)۴ گوزپشتی

(۱۰۱۰)۳ اسکولیوز

۱۸) در کدام نوع از ناتوانی حرکتی از طبقه بندی فلج مغزی ، فرد بیمار قادر به حفظ تعادل خود نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است؟

(۱۰۱۰)۲ ترکیبی

(۱۰۱۰)۱ انقباضی

(۱۰۱۰)۴ عدم تعادل مخچه ای

(۱۰۱۰)۳ حرکت غیرارادی

۱۹) متداول ترین نارسایی ناتوانی ساز دائمی از هنگام تولد، چه می باشد؟

(۱۰۱۰)۲ شکاف ستون فقرات

(۱۰۱۰)۱ ضایعات نخاعی

(۱۰۱۰)۴ منزّیت

(۱۰۱۰)۳ تولد زودرس

۲۰) ضایعه نخاعی بین کدام مهره های گردنی باعث فلج چهارستون بدن می شود؟

(۱۰۱۰)۲ مهره ۲ تا ۵ گردنی

(۱۰۱۰)۱ مهره ۲ تا ۴ گردنی

(۱۰۱۰)۴ مهره ۳ تا ۷ گردنی

(۱۰۱۰)۳ مهره ۳ تا ۶ گردنی

۲۱) کدام بیماری به خواب و خیال در بیداری تعبیر می شود؟

(۱۰۱۰)۲ بیش فعالی

(۱۰۱۰)۱ کمبود توجه

(۱۰۱۰)۴ اتیسم

(۱۰۱۰)۳ صرع

۲۲) اتیسم از چه زمانی شروع می شود؟

(۱۰۱۰)۱ بعد از ۱ سالگی

(۱۰۱۰)۲ قبل از ۶ ماهگی

(۱۰۱۰)۳ قبل از ۳۰ ماهگی

(۱۰۱۰)۴ قبل از سنین مدرسه

(۲۳) در کدام نوع صرع ، فرد به یکباره بیهوش می شود و محکم به زمین می خورد و بدنش سفت و سخت می شود؟

(۱۰۱۰)۴ روانی - حرکتی (۱۰۱۰)۳ کوچک (۱۰۱۰)۲ متوسط (۱۰۱۰)۱ بزرگ

(۲۴) در کدام نوع از بیماری ام اس ، افراد دچار حملاتی می شوند که فقط باعث از دست رفتن بینایی و یا حس های دیگر آنها می شود و معمولاً این علائم موقتی بوده و خیلی به ندرت باعث بروز ناتوانی دائمی می شود؟

(۱۰۱۰)۱ پیش رونده اولیه

(۱۰۱۰)۲ پیش رونده ثانویه

(۱۰۱۰)۳ پیش رونده عود کننده

(۱۰۱۰)۴ حسی خوش خیم

(۲۵) کدام دسته از اختلالات روانی ، اختلالاتی را در بر می گیرد که با آشتفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت ها تظاهر کرده و اغلب با هذیان و توهمندی همراه است؟

(۱۰۱۰)۲ اضطرابی (۱۰۱۰)۱ روان گسیختگی (اسکیزوفرنی)

(۱۰۱۰)۴ وسواس فکری عملی (۱۰۱۰)۳ ساختگی

(۲۶) علائمی نظیر رنگ پریدگی پوست ، چهره بیمناک ، کاهش ترشح بزاق و تپش تنده ضربان قلب مربوط به کدام پاسخ ترس است؟

(۱۰۱۰)۴ رفتاری (۱۰۱۰)۳ بدنی (۱۰۱۰)۲ شناختی (۱۰۱۰)۱ هیجانی

(۲۷) زمانی که فرد قادر نیست خاطرات مهم را به خاطر آورد ولی مطالب جدید را می تواند بیاموزد دچار چه اختلالی است؟

(۱۰۱۰)۴ اختلال حافظه (۱۰۱۰)۳ اختلال تجزیهای (۱۰۱۰)۲ اختلال آلزایمر (۱۰۱۰)۱ اختلال دمانس

(۲۸) شوک درمانی به کدام اختلال روانی جواب مثبت می دهد؟

(۱۰۱۰)۴ اضطراب (۱۰۱۰)۳ افسردگی دوقطبی (۱۰۱۰)۲ افسردگی (۱۰۱۰)۱ وسواس

(۲۹) معلول اجتماعی بر حسب چه چیزی تعریف می شود؟

(۱۰۱۰)۴ فرهنگ اجتماع (۱۰۱۰)۳ عامل انحراف (۱۰۱۰)۲ جنسیت افراد (۱۰۱۰)۱ سن افراد

(۳۰) کدام مورد به عنوان آسیب مهم و اجتماعی مطرح بوده و حیات مادی و معنوی فرد و جامعه را به خطر می اندازد؟

(۱۰۱۰)۴ اعتیاد (۱۰۱۰)۳ دزدی (۱۰۱۰)۲ فحشا (۱۰۱۰)۱ تکدی گری

بيان صحيحة	شماره سهوال
ج	1
د	2
ج	3
الف	4
ب	5
الف	6
الف	7
ج	8
ج	9
الف	10
ج	11
د	12
د	13
ب	14
الف	15
ب	16
ج	17
د	18
ب	19
د	20
د	21
ج	22
الف	23
ج، د	24
الف	25
ج	26
ج	27
ب	28
ج	29
ب	30

۱- پیام توان بخشی توسط چه کسی در سراسر جهان اعلام گردید؟

۴. پینل

۳. کروپ لین

۲. راسک

۱. کسلر

۲- غیر عادی بودن ساختار، نمود ظاهری بدن ناشی از چیست؟

۴. بیماری

۳. معلولیت

۲. نقص

۱. ناتوانی

۳- در سال..... در ایران پذیرش داشجو در مقطع کارشناسی در رشته تحصیلی فیزیو تراپی، کار درمانی و گفتار درمانی آغاز شده است.

۱352 .۴

1361 .۳

1360 .۲

1358 .۱

۴- در این نوع نقص حسی و عصبی باقی می ماند و این نوع نقص شناوی به طور صد درصد بهبود نمی یابد.

۲. نقص شناوی غیر عضوی

۱. نقص شناوی آمیخته

۴. نقص شناوی انتقالی

۳. نقص شناوی مرکزی

۵- کاشت حلزون نوعی روش درمانی برای افراد با شناوی در چه حدی موثر است؟

۴. خفیف

۳. شدید

۲. متوسط

۱. عمیق

۶- در کدام سطح بینایی کودک برای انجام دادن تکالیفی که به بینایی نیاز دارد زمان و انرژی بیشتری لازم دارد و سطح کارکردی او حتی به کمک وسایل ویژه از دقت بینایی کمتری برخوردار است؟

۲. معلولیت بینایی شدید

۱. معلولیت بینایی عمیق

۴. معلولیت بینایی خفیف

۳. معلولیت بینایی متوسط

۷- کدام نوع معلولیت در کودکان دارای کلامی گرایی است؟

۴. اوتیسم

۳. بیش فعالی

۲. کم توان ذهنی

۱. نابینایی

۸- آنوسی.....

۲. عفونت های شدید

۱. تومور مغزی

۴. صدمه مستقیم سرو مغز

۳. نرسیدن اکسیژن لازم در زمان تولد

۹- در حمایت از کودکان دارای ناتوانی ذهنی در کدام مورد کارکنان کمتری نیاز است و هزینه کمتری نیاز دارد؟

۴. فراغت

۳. گسترده

۲. محدود

۱. متناوب

۱۰- در علائم بیماری هیدرو سفال کدام مورد درست بیان نشده است؟

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| ۱. وجود اختلالات حسی و حرکتی | ۲. فاصله استخوان های سر | ۳. وجود رفتار ناگهانی | ۴. چهره بخصوص در بیمار |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|

۱۱- اختلال گفتاری که به دلیل آسیب به مناطقی از مغز اتفاق می افتد؟

- | | | | |
|------------|----------|-----------|---------|
| ۱. آفارازی | ۲. بروکا | ۳. ورنیکه | ۴. لکنت |
|------------|----------|-----------|---------|

۱۲- تشخصی ناتوانی ذهنی قبل از چه سنی آغاز می شود؟

- | | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| ۱. ۶ سالگی | ۲. ۸ سالگی | ۳. ۱۸ سالگی | ۴. ۱۵ سالگی |
|------------|------------|-------------|-------------|

۱۳- از اولین علت معلولیت در کهنسالان است؟

- | | | | |
|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| ۱. ضایعات نخاعی | ۲. سکته مغزی | ۳. دیابت | ۴. پوکی استخوان |
|-----------------|--------------|----------|-----------------|

۱۴- متداول ترین نارسایی ناتوانی سازی دائمی از هنگام تولد چیست؟

- | | | | |
|-------------|--------------------|-----------------|---------------|
| ۱. فلچ مغزی | ۲. شکاف ستون فقرات | ۳. ضایعات نخاعی | ۴. آسیب نخاعی |
|-------------|--------------------|-----------------|---------------|

۱۵- در کدام نوع ناتوانی فرد قادر به حفظ تعادل خود نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است؟

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| ۱. ناتوانی انقباضی | ۲. حرکت غیر ارادی | ۳. ناتوانی ترکیبی | ۴. ناتوانی تعادل مخچه ای |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|

۱۶- وسیله ای برای استفاده از نیروهای اندام فوقانی در بدن.....

- | | | | |
|---------|---------|------------------|---------|
| ۱. واکر | ۲. کراج | ۳. صندلی چرخ دار | ۴. ارتز |
|---------|---------|------------------|---------|

۱۷-مربوط به اختلالات فراگیر رشدی است.

- | | | | |
|-------------------|----------|--------|----------|
| ۱. توجه بیش فعالی | ۲. ام اس | ۳. صرع | ۴. اتیسم |
|-------------------|----------|--------|----------|

۱۸- کمبود توجه/بیش فعالی در واقع اختلالی با شروعهمراه با نشانه های رفتاری است که قبل یا همزمان با آغاز مدرسه خود رانشان میدهد.

- | | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|
| ۱. دیررس | ۲. زود رس | ۳. رفتاری | ۴. یادگیری |
|----------|-----------|-----------|------------|

-۱۹- در کدام نوع ام اس بیماران دچار حملاتی می شوند که باعث از دست رفتن بینایی و حس هادیگر به طور موقت می گردد؟

- | | | | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|
| ۴. نوع اولیه | ۳. نوع خوش خیم | ۲. نوع ثانویه | ۱. نوع عود کننده |
|--------------|----------------|---------------|------------------|

-۲۰- در هر ده هزار کودک نفر به اختلال اتیسم مبتلا می شوند.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| ۳ . ۴ | ۶ . ۳ | ۵ . ۲ | ۴ . ۱ |
|-------|-------|-------|-------|

-۲۱- از نیازهای توان بخشی افراد مبتلا به بیش فعالی / کمبود توجه نیست.

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| ۲. مشاوره باوالدین | ۱. تشخیص و مداخله پزشکی |
|--------------------|-------------------------|

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ۴. خدمات توان بخشی و آموزشی | ۳. تجهیزات خاص توان بخشی |
|-----------------------------|--------------------------|

-۲۲- در جمعیت جهان چند درصد از بیماری روان گسیختگی رنج می برند؟

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۴ . ۴ در صد | ۳ . ۱ در صد | ۲ . ۳ در صد | ۱ . ۲ در صد |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

-۲۳- مسئولیت هدایت و حمایت ، ملاقات و پیگیری از بیماران که دچار اختلال روانی هستند بر عهده کیست؟

- | | | | |
|-----------|----------------|------------|---------------------|
| ۴. پزشکان | ۳. روان پرستار | ۲. خانواده | ۱. مددکاران اجتماعی |
|-----------|----------------|------------|---------------------|

-۲۴- در چه نوع اختلالی بیمار قادر به یادآوری خاطرات مهم نیست اما مطالب جدید را می تواند بیاموزد؟

- | | |
|------------------|--------------------|
| ۲. اختلال ساختگی | ۱. اختلال تجزیه ای |
|------------------|--------------------|

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ۴. اختلال هذیان | ۳. اختلال روان گسیختگی |
|-----------------|------------------------|

-۲۵- کدام دسته جزء طبقه بندی معلولان اجتماعی است؟

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ۲. کم توان ذهنی | ۱. کمبود توجه بیش فعالی |
|-----------------|-------------------------|

- | | |
|---------------------|----------|
| ۴. کودکان اسیب دیده | ۳. اتیسم |
|---------------------|----------|

-۲۶- اقدامات توانبخشی کودکان خیابانی در پیشگیری ثانویه.....

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ۲. تدوین قوانین مناسب | ۱. اتخاذ سیاست ها |
|-----------------------|-------------------|

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ۴. ایجاد زمینه برای تحصیل کودکان | ۳. شناسایی کودکان خیابانی |
|----------------------------------|---------------------------|

۲۷- از جمله اقدامات در زمینه بازپروری و توان بخشی زنان کدام مورد نادرست ذکر شده است؟

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ۱. آموزش تعلیمات عمومی | ۲. حرفه آموزی |
| ۳. پیشگیری از آسیب اجتماعی | ۴. ایجاد ساختار حمایت کننده |

۲۸- در سطوح پیشگیری از آسیب اجتماعی جلوگیری از شدت یافتن آسیب اجتماعی و کاستن از تنفس آن در خانواده در کدام سطح قرار می گیرد؟

- | | |
|------------|--------------|
| ۱. سطح اول | ۲. سطح دوم |
| ۳. سطح سوم | ۴. سطح چهارم |

۲۹- طبق آمار بین الملل در هر جامعه چند درصد مردم به انواع اختلالات دچار هستند؟

- | | |
|------------|------------|
| ۱. ۱۰ درصد | ۲. ۲۵ درصد |
| ۳. ۵ درصد | ۴. ۱۵ درصد |

۳۰- کدام یک از موارد زیر جزء اختلالات شناختی نیست؟

- | | |
|----------------|-----------------|
| ۱. روان اشفتگی | ۲. روان گسیختگی |
| ۳. دمانس | ۴. نیسانی |

شماره سؤال	پاسخ صحیح
1	الف
2	ب
3	ج
4	الف، ج
5	الف
6	ب
7	الف
8	ج
9	ب
10	ج
11	الف
12	ج
13	ب
14	ب
15	د
16	ب
17	د
18	ب
19	ج
20	ب
21	ج
22	ج
23	ج
24	الف
25	د
26	ج
27	ج
28	ج
29	ب
30	ب

۱- در قرن نوزدهم گسترش رویکرد کدام علم آغازی برای شکل گیری مفهوم توانبخشی بود؟

- | | | | |
|---------------|--------------------|----------|--------------|
| ۴. زیست‌شناسی | ۳. مددکاری اجتماعی | ۲. پزشکی | ۱. روانشناسی |
|---------------|--------------------|----------|--------------|

۲- برنامه تربیت شنیداری به افراد مبتلا به آسیب شنوازی در حیطه کدام نوع توانبخشی قرار دارد؟

- | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| ۴. توانبخشی پزشکی | ۳. توانبخشی آموزشی | ۲. توانبخشی حرفه‌ای | ۱. توانبخشی روانی |
|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|

۳- از دست دادگی میزان شنوازی بین ۷۰ - ۵۶ دسیبل چه نوع عارضه شنوازی ایجاد میکند؟

- | | | | |
|---------|---------------------|----------|----------|
| ۴. شدید | ۳. متوسط رو به شدید | ۲. متوسط | ۱. مختصر |
|---------|---------------------|----------|----------|

۴- کدام بیماری باعث نارسایی در عملکرد استخوانچه رکابی در گوش میانی و احتمال نارسایی شنوازی میشود؟

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| ۴. توکسوپلاسموس | ۳. اتواسکلروزیس | ۲. سرخچه مادرزادی | ۱. سیتومگالو |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|

۵- در نقص شنوازی انتقالی، کدام قسمت گوش دچار آسیب میشود؟

- | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ۴. حلقه گوش | ۳. گوش داخلی | ۲. گوش میانی | ۱. گوش خارجی |
|-------------|--------------|--------------|--------------|

۶- در کدام روش ارتباطی ناشنوایان، باقیمانده شنوازی فرد تقویت شده و از طریق گفتارخوانی و تکلم برای رشد مهارت‌های ارتباطی استفاده میشود؟

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ۲. روش هجی کردن با انگشتان | ۱. زبان اشاره |
|----------------------------|---------------|

- | | |
|------------------------|-------------|
| ۴. روش شفاهی - شنیداری | ۳. روش جامع |
|------------------------|-------------|

۷- مرز بین نابینایی و بینایی چه نسبتی است؟

- | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| ۴. $\frac{۳۰}{۲۰۰}$ | ۳. $\frac{۲۰}{۷۰}$ | ۲. $\frac{۱۰}{۲۰۰}$ | ۱. $\frac{۲}{۲۰۰}$ |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|

۸- جهت ارزیابی حدت بینایی فرد باید در چه فاصل ای از تابلوی اسنلن قرار گیرد؟

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ۴. ۷ متر | ۳. ۶ متر | ۲. ۵ متر | ۱. ۴ متر |
|----------|----------|----------|----------|

۹- بر طبق دیدگاه پیازه، کدام دوره تحول روانی پایه و اساس تحولات بعدی از نظر جسمانی و تجربه منطقی - ریاضی است؟

- | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| ۴. انتزاعی | ۳. عملیات عینی | ۲. پیش عملیاتی | ۱. حسی - حرکتی |
|------------|----------------|----------------|----------------|

-۱۰- کودکان نابینا از نظر پیشرفت تحصیلی به طور متوسط چند سال از همسالان بینای خود عقب تر هستند؟

۴. چهار سال

۳. سه سال

۲. دو سال

۱. یک سال

-۱۱- کدام مورد زیر جزو اهداف کلی موسیقی درمانی است؟

۲. تغییرات رفتاری و رشدی

۴. تحریک خلاقیت و تصویرسازی

۱. کاستن از ناسازگاریها

۳. افزایش مهارت‌های ارتباطی

-۱۲- گودارد نظام طبقه بندی خود را از کم توانی ذهنی بر چه پایه‌ای پیشنهاد کرد؟

۴. شاخص رشدی

۳. بهره اجتماعی

۲. بهره هوشی

۱. سن عقلی

-۱۳- کدام گروه کودکان با کم توانی ذهنی در سطح تربیت‌پذیر پایین میباشند؟

۲. کم توان ذهنی شدید

۴. کم توان ذهنی خفیف

۱. کم توان ذهنی متوسط

۳. کم توان ذهنی عمیق

-۱۴- کدام بیماری با تشخیص سریع و درمان فوری از طریق رژیم غذایی خاص از پیامدهای مخرب آن جلوگیری می‌شود؟

۴. سندرم کلاین فلتر

۳. میکروسفالی

۲. فنیل کتونوری

۱. منگولیسم

-۱۵- اختلال گفتاری که به دلیل آسیب مغزی صورت گیرد چه نامیده میشود؟

۴. آفازیا

۳. هیپرترمی

۲. دیسلکسیا

۱. کرتینیسم

-۱۶- چه کسی بیشترین نقش را در توانبخشی کودکان با کم توانی ذهنی به عهده دارد؟

۴. روانشناسان

۳. مددکاران اجتماعی

۲. کار درمان گرای

۱. پزشکان متخصص

۴. چنگ زدن

۳. نشستن

۲. سینه خیز رفتن

۱. کنترل سر و گردن

-۱۷- کدام مورد زیر جزو مهارت‌های حرکتی ظرفی است؟

۴. ترکیبی

۳. عدم تعادل مخچه‌ای

۲. حرکت غیرارادی

۱. انقباضی

-۱۸- در کدام نوع ناتوانی حرکتی ناشی از فلجه مغزی، فرد مبتلا دارای عضلات سفت، منقبض و متنشج میباشد؟

۴. ریتالین

۳. تالیدومید

۲. آنتی هیستامین

۱. متادون

-۱۹- مصرف کدام دارو توسط مادر سبب نقیصه مادرزادی رشد نیافتگی بخششایی از اندام حرکتی به خصوص دستها میشود؟

-۲۰- تعدادی از دانش آموزان معلول جسمی - حرکتی که عموماً علاوه بر نقص حرکتی دارای نارساییها، مسائل و مشکلات متعددی هستند، چه امکانات آموزشی برای آنها مناسب است؟

۱. آموزش در مدارس عادی همراه با سایر دانش آموزان
۲. آموزش در کلاسهای خاص
۳. آموزش در مراکز خاص
۴. آموزش در مدارس عادی همراه با معلم سیار

-۲۱- کدام ملاک زیر جهت تشخیص اتیسم درست نیست؟

۱. انزوای اجتماعی
۲. رفتارهای کلیشه ای و یکنواخت
۳. نقایص زبانی
۴. تمایل به بازی

-۲۲- کدام بیماری را به خواب و خیال در بیداری تعبیر میکنند؟

۱. کمبود توجه
۲. اتیسم
۳. مولتیپل اسکلروزیس
۴. صرع

-۲۳- کدام مورد زیر ویژگی مشترک همه انواع صرع میباشد؟

۱. از دست دادن هوشیاری
۲. سفت و سخت شدن بدن
۳. تخلیه ناگهانی انرژی الکتریکی سلولهای مغز
۴. درگیر شدن تمام محدوده مغز

-۲۴- در بین افراد جامعه میزان شیوع عارضه صرع چند درصد است؟

۱. ۵/۰ - ۱ درصد
۲. ۱- ۵/۱ درصد
۳. ۲- ۵/۱ درصد
۴. ۴- ۵/۲ درصد

-۲۵- کدام مورد زیر جزو نشانه های اصلی بیماری ایدز است؟

۱. سرفهای مداوم بیش از یک ماه
۲. کاهش ۱۰ درصد وزن بدن به طور ناگهانی
۳. تورم غدد لنفاوی در سطح بدن
۴. زخمهای خارش دار پوستی در سطوح بدن

-۲۶- کدام اختلال روانی با آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیتها تظاهر کرده و اغلب با هذیان و توهمند همراه هستند؟

۱. اختلالات شناختی
۲. اختلالات خلقی
۳. اختلالات ساختگی
۴. اسکیزوفرنی

-۲۷- در کدام نوع اختلال، بیمار علائم بیماری را نشان میدهد و باور دارد که به یک بیماری دچار شده در حالی که چنین بیماری وجود ندارد؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات شبه جسمی
۳. اختلالات هویتی
۴. اختلالات ساختگی

-۲۸- کدام نوع اختلالات روان نژنده در اثر کشمکش های روانی به وجود می آید و در آنها اختلال کارکرد روانی جزئی است؟

- ۱. افسردگی دو قطبی
- ۲. وسوس
- ۳. اسکیزوفرنیا
- ۴. پارانویا

-۲۹- کدام شیوه ارزیابی روان شناختی وسیله مطلوب روانشناسان بالینی و روان پزشکان است؟

- ۱. مشاهده
- ۲. بکارگیری آزمونهای روانی
- ۳. مصاحبه بالینی
- ۴. روش آزمایشی

-۳۰- کدام دیدگاه انحراف را رفتاری تبھکارانه محسوب میکند که خلاف موازین اجتماعی مورد قبول است و وجودش برای دوام نظام و ایجاد عدالت زیان بخش میباشد؟

- ۱. جامعه شناسی
- ۲. روانشناسی
- ۳. حقوقی
- ۴. اخلاقی

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	ج
3	ج
4	ج
5	ب
6	د
7	د
8	ج
9	الف
10	ب
11	ب
12	الف
13	ب
14	ب
15	د
16	ب
17	د
18	الف
19	ج
20	ج
21	د
22	ب
23	ج
24	الف
25	ب
26	د
27	ب
28	ب
29	ج
30	الف

۱- طبقه بندی اختلالات روانی برای اولین بار توسط چه کسی ارائه شده است؟

۴. زیگموند فروید

۳. امیا کروپ لین

۲. فلیپ پنیل

۱. چارکوت

۲- سازمان بهداشت جهانی چه سالی را به عنوان سال توجه به معلولان نامگذاری کرده است؟

۱999 . ۴

۱981 . ۳

۱971 . ۲

۱994 . ۱

۳- آموزش مهارت های مربوط به فعالیت های روزمره زندگی به انواع معلولان در کدام حیطه توان بخشی قرار دارد؟

۴. توان بخشی اجتماعی

۳. توان بخشی آموزشی

۲. توان بخشی حرفه ای

۱. توان بخشی تخصصی

۴- فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران به کدام مفهوم دلالت دارد؟

۴. معلولیت

۳. بیماری

۲. ناتوانی

۱. نقص

۵- حس توازن بر عهده کدام بخش گوش است؟

۴. قسمت حلزونی

۳. قسمت دهلیزی

۲. پرده صماخ

۱. مجار شناوی

۶- افت شناوی طبیعی در انسان چند دسی بل است؟

۱5 . ۱ تا ۱۵

۱۵ تا ۰ . ۳

۲۰ تا ۱ . ۲

۰ تا ۲۰ . ۱

۷- ویروس سیتو مگالو به عنوان عامل معلولیت شناوی مربوط به کدام دسته عوامل است؟

۴. عوامل ناشناخته

۳. عوامل حین تولد

۲. عوامل پیش از تولد

۱. عوامل پیش از تولد

۸- کدام بازتاب در شناوی سنجی از طریق بازتاب ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

۴. بازتاب گونه

۳. بازتاب تونیک گردن

۲. بازتاب مورو

۱. بازتاب بابینسکی

۹- بهترین راهکار برای پیشگیری از معلولیت شناوی چیست؟

۲. تشخیص زود هنگام

۴. کاشت حلزون

۱. پیشگیری از ازدواج فامیلی

۳. استفاده از سمعک

۱۰- مرکز پردازش پیام های عصبی بصری کدام بخش مغز است؟

۴. آهیانه ای

۳. پس سری

۲. پیش پیشانی مغز

۱. پیشانی مغز

۱۱- کدام قسمت چشم میزان نور وارد شده به چشم را تنظیم می کند؟

۴. عدسی

۳. مردمک

۲. عنبه

۱. قرنیه

۱۲- وجود لکه های سفید در روی مردمک چشم، به کدام بیماری چشمی دلالت دارد؟

۴. نیستاگموس

۳. آب مروارید

۲. آب سیاه

۱. تراخم

۱۳- استفاده از توب های استیکار برای ارزیابی کدام یک از موارد زیر در کودکان کاربرد دارد؟

۴. میدان دید

۳. تیز بینی

۲. دوربینی

۱. نزدیک بینی

۱۴- درصد کودکان کم توان ذهنی مربوط به کدام گروه است؟

۲. کودکان کم توان ذهنی متوسط

۴. کودکان کم توان ذهنی عمیق

۱. کودکان کم توان ذهنی خفیف

۳. کودکان کم توان ذهنی شدید

۱۵- در کدام نوع آفازی فرد کلمات را به خوبی بر زبان می آورد اما معنا و مفهوم کلمات را نمی داند؟

۴. آفازی گفتاری

۳. آفازی ورنیکه

۲. آفازی بیانی

۱. آفازی بروکا

۱۶- اولین علت معلولیت در کهنسالان چیست؟

۴. بیماری قند

۳. پوکی استخوان

۲. سکته مغزی

۱. دیابت

۱۷- وسیله که برای استفاده از نیروهای اندام فوقانی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟

۴. ویلچر

۳. پروتز

۲. واکر

۱. کراج

۱۸- عدم تماس چشمی و انزوای اجتماعی از نشانه های کدام اختلال است؟

۴. اتیسم

۳. مولتیپل اسکلروزیس

۲. صرع

۱. بیش فعالی

۱۹- کدام اختلال عمدتا در سنین 20-30 سالگی شایع است؟

۴. سکته مغزی

۳. فلج مغزی

۲. اتیسم

۱. مولتیپل اسکلروزیس

۲۰- استفاده از داروهای محرک برای درمان کدام اختلال تجویز می شود؟

۴. صرع

۳. بیش فعالی

۲. اتیسم

۱. سندروم داون

-۲۱- در کدام نوع ام اس، فرد دچار حملات که منجر به از دست رفتن بینایی و یا سایر حس‌ها به صورت موقت می‌گردد؟

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| ۱. ام اس عود کننده- پیش رونده | ۲. ام اس پیشرونده اولیه | ۳. ام اس حسی خوش خیم |
| ۴. ام اس پیشرونده ثانویه | | |

-۲۲- ویروس اچ آی وی از کدام یک از روش‌های زیر سرایت نمی‌کند؟

- | | | |
|--|---|--------------|
| ۱. استفاده از سوزن مشترک در دندانپزشکی | ۲. انتقال از مادر به نوزاد در دوران شیر دهنده | ۳. گزش حشرات |
| ۴. استفاده از سوزن مشترک در آرایشگاه | | |

-۲۳- آشتفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت از نشانه‌های کدام دسته از اختلالات روانی می‌باشد؟

- | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| ۱. اختلالات شناختی | ۲. اسکیزوفرنی | ۳. اختلالات ساختگی | ۴. اختلالات تجزیه‌ای |
| ۵. هیچکدام | | | |

-۲۴- ترس، وسواس و اضطراب مربوط کدام دسته از بیماری‌ها محسوب می‌شوند؟

- | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|------------|
| ۱. روان پریشی | ۲. روان نژنده | ۳. سایکوسوماتیک | ۴. هیچکدام |
| ۵. درصد | | | |

-۲۵- بر اساس آمار بین‌المللی چند درصد افراد جامه به انواع اختلالات روانی مبتلا هستند؟

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| ۱. ۱۰ درصد | ۲. ۱۳ درصد | ۳. ۲۵ درصد | ۴. ۳۰ درصد |
| ۵. درصد | | | |

-۲۶- تشخیص زود هنگام و پیشگیری از وخامت اختلالات روانی مربوط به کدام سطح از پیشگیری اختلالات روانی است؟

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| ۱. پیشگیری سطح اول | ۲. پیشگیری سطح دوم | ۳. پیشگیری سطح سوم | ۴. پیشگیری درمان |
| ۵. درصد | | | |

-۲۷- کدام اختلال در محاکم قانونی به عنوان اختلال ادواری هم شناخته می‌شود؟

- | | | | |
|--------------------|---------------|------------------|----------------------|
| ۱. افسردگی دو قطبی | ۲. اسکیزوفرنی | ۳. اختلال ساختگی | ۴. پیشگیری از احتلال |
| ۵. درصد | | | |

-۲۸- تعریف انحراف به عنوان دوری از راه اصلی و سرپیچی و تخلف از ارزش‌های موجود جامعه، مربوط به کدام دیدگاه است؟

- | | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| ۱. روانشناسان | ۲. حقوق دانان | ۳. علمای اخلاق | ۴. جامعه شناسان |
| ۵. درصد | | | |

-۲۹- طرح حمایت از ایتمام تحت عنوان اکرام ایتمام توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در چه سالی ایجاد شده است؟

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| ۱. ۱۳۷۰ | ۲. ۱۳۷۳ | ۳. ۱۳۷۸ | ۴. ۱۳۹۸ |
| ۵. درصد | | | |

-۳۰- معیار سنی بزهکاری کودکان در ایران چند سال است؟

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۱. ۱۰ سالگی | ۲. ۱۵ سالگی | ۳. ۱۸ سالگی | ۴. ۲۰ سالگی |
| ۵. درصد | | | |

ماسح صحيح **شمارد سوال**

- | | |
|----|-----|
| 1 | ج |
| 2 | ج |
| 3 | ج |
| 4 | د |
| 5 | ج |
| 6 | ج |
| 7 | الف |
| 8 | ب |
| 9 | ب |
| 10 | ج |
| 11 | ج |
| 12 | ج |
| 13 | د |
| 14 | الف |
| 15 | ج |
| 16 | ب |
| 17 | الف |
| 18 | د |
| 19 | الف |
| 20 | ج |
| 21 | ج |
| 22 | ج |
| 23 | ب |
| 24 | ب |
| 25 | ج |
| 26 | ب |
| 27 | ب |
| 28 | ج |
| 29 | ب |
| 30 | ج |

۱- وسیله ای است در جهت تغییر زندگی معلولان برای استقلال بیشتر؟

۴. ارزیابی

۳. توان بخشی

۲. سبب شناسی

۱. طبقه بندی معلولیت

۲- طرح توان بخشی مبتنی بر جامعه در چه زمانی با طرح های قبلی جایگزین شده است؟

۲. دهه پنجم قرن نوزدهم

۱. اوایل قرن نوزدهم

۴. دهه شصت قرن بیستم

۳. اوایل قرن بیستم

۳- سازمان بهداشت جهانی چه سالی را به عنوان سال جهانی توجه به معلولان نام گذاری کرده است؟

۴. سال 1994

۳. سال 1981

۲. سال 1991

۱. سال 1992

۴- برنامه تربیت شنیداری به افراد مبتلا به آسیب شنوایی جزء کدام حیطه توان بخشی می باشد؟

۴. توان بخشی آموزشی

۳. توان بخشی اجتماعی

۲. توان بخشی روانی

۱. توان بخشی روایی

۵- فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهمیم شدن در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران دلالت به تعریف کدام یک از مفاهیم زیر دارد؟

۴. بیماری

۳. ناتوانی

۲. نقص

۱. معلولیت

۶- کدام بخش گوش مسئولیت حس توازن را بر عهده دارد؟

۴. استخوانچه رکابی

۳. دهلیزی گوش

۲. حلزون گوش

۱. پرده گوش

۷- افرادی با افت شنوایی به مقدار ۴۰-۲۶ دسی بل در کدام طبقه از درجه بندی آسیب شنوایی قرار دارد؟

۴. شدید

۳. متوسط

۲. مختصر

۱. خفیف

۸- در کدام روش آموزش کودکان ناشنوا چشم اندازی گوش او را می گیرد؟

۲. روش زبان اشاره و هجی با انگشتان

۱. روش شفاهی - شنیداری

۴. روش ترکیبی

۳. روش مختلط

۹- کاشت حلزون برای چه گروهی از افراد ناشنوا و کم شنوا مفید می باشد؟

۲. نقص شنوایی انتقالی

۱. نقص شنوایی حسی- عصبی

۴. نقص شنوایی غیر عضوی

۳. نقص شنوایی مرکزی

- ۱۰- کدام قسمت مغز محل پردازش پیام های بصری می باشد؟
۱. قسمت پیشانی مغز ۲. قسمت پس سری مغز ۳. قسمت گیجگاهی مغز ۴. قسمت آهیانه ای مغز
- ۱۱- اگر زاویه دیدی فردی کمتر از ۲۰ درجه باشد نقص بینایی وی در کدام گروه طبقه بندی می گردد؟
۱. نابینای مطلق ۲. نابینا ۳. نیمه بینا ۴. دیر بینا
- ۱۲- برای ارزیابی تیزبینی چشم فاصله فرد با تابلو استلن باید چقدر باشد؟
۱. ۲ متر ۲. ۴ متر ۳. ۵ متر ۴. ۶ متر
- ۱۳- آنوسی مربوط به کدام یک از عوامل مربوط در سبب شناسی کم توانی ذهنی است؟
۱. عوامل قبل از تولد ۲. عوامل حین تولد ۳. عوامل بعد از تولد ۴. عوامل ناشناخته
- ۱۴- کودکان با کم توانی ذهنی متوسط از نظر آموزشی در کدام سطح قرار دارند؟
۱. آموزش پذیر ۲. تربیت پذیر بالا ۳. تربیت پذیر پایین ۴. حمایت پذیر
- ۱۵- بیماری فنیل کتونوری جزء اختلالات مربوط به سوخت و ساز کدام دسته مواد غذایی می باشد؟
۱. چربی ها ۲. پروتئین ها ۳. مواد قندی ۴. کربوهیدرات ها
- ۱۶- کدام گروه بیشترین نقش را در توان بخشی کودکان با کم توانی ذهنی ایفا می کنند؟
۱. روان شناسان ۲. مددکاران اجتماعی ۳. کاردemanگران ۴. فیزیوتراپ ها
- ۱۷- اولین علت معلولیت در کهنسالی کدام یک از مواد زیر است؟
۱. فلچ مغزی ۲. ضایعات نخاعی ۳. سکته مغزی ۴. سکته قلبی
- ۱۸- متداول ترین نارسایی ناتوانی ساز دائمی از هنگام تولد کدام یک از عوامل زیر می باشد؟
۱. فلچ مغزی ۲. فلچ اطفال ۳. شکاف ستون فقرات ۴. ضایعه نخاعی
- ۱۹- اختلال در روابط اجتماعی و زبان و رفتار های کلیشه ای از نشانه های کدام بیماری هستند؟
۱. اتیسم ۲. بیش فعالی ۳. بیش فعالی همراه با نقص توجه ۴. صرع

-۲۰- کدام نوع صرع ناگهانی و بدون مقدمه شروع می شود و فرد دچار تشنج نمی شود؟

- | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| ۱. صرع بزرگ | ۲. صرع کوچک | ۳. صرع روانی - حرکتی | ۴. صرع منتشر |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|

-۲۱- خطرناک ترین نوع بیماری مولتیپل اسکلروزیس کدام نوع است؟

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| ۱. پیشرونده - عود کننده | ۲. پیشرونده - اولیه | ۳. پیشرونده - ثانویه | ۴. عود کننده - فروکش کننده |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|

-۲۲- در کدام مرحله ایدز افراد مبتلا نشانه هایی شبیه به سرماخوردگی را برای چند روز تا چند هفته نشان می دهند؟

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| ۱. مرحله اول | ۲. مرحله دوم | ۳. مرحله سوم | ۴. مرحله چهارم |
|--------------|--------------|--------------|----------------|

-۲۳- ایدز با کدام یک از راه های زیر انتقال نمی یابد؟

- | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------|---------|
| ۱. تماس جنسی | ۲. انتقال خونی | ۳. انتقال از مادر به جنین | ۴. سرفه |
|--------------|----------------|---------------------------|---------|

-۲۴- کدام یک بیماری های زیر اختلالات خلقی محسوب می شود؟

- | | | | |
|---------------|----------|----------|------------|
| ۱. اسکیزوفرنی | ۲. فوبیا | ۳. وسواس | ۴. افسردگی |
|---------------|----------|----------|------------|

-۲۵- ادراک چیزی که بیرون از ذهن، وجود خارجی ندارد دلالت به کدام یک از نشانه های بیماری اسکیزوفرنی دارد؟

- | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|
| ۱. خطای ادراکی | ۲. توهمندی | ۳. هذیان | ۴. دمانس |
|----------------|------------|----------|----------|

-۲۶- بر اساس آمار بین المللی چند درصد مردم به اختلالات روانی مبتلا هستند؟

- | | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ۱. ۱۵ درصد | ۲. ۱/۵ درصد | ۳. ۲۵ درصد | ۴. ۲/۵ درصد |
|------------|-------------|------------|-------------|

-۲۷- تعریف انحراف به عنوان رفتاری تبیهکارانه که خلاف موازین اجتماعی است مربوط به کدام دیدگاه است؟

- | | | | |
|----------------|-----------------|--------------|---------|
| ۱. روان‌شناسان | ۲. جامعه‌شناسان | ۳. حقوقدانان | ۴. مذهب |
|----------------|-----------------|--------------|---------|

-۲۸- سن قانونی برای اطلاق بزهکاری برای فردی در ایران چه سنی تعریف شده است؟

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ۱. ۱۵ سال | ۲. ۱۶ سال | ۳. ۱۸ سال | ۴. ۲۰ سال |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

-۲۹- از نظر محققان آسیب های اجتماعی شرط اول و لازمه ابتلا به اعتیاد کدام یک از موارد زیر است؟

- | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|
| ۱. وضعیت مالی | ۲. شخصیت افراد | ۳. دوستان | ۴. وضعیت اشتغال |
|---------------|----------------|-----------|-----------------|

اجتماعی است؟

- آموزش مهارت های زندگی برای کل افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان مربوط به کدام سطح پیشگیری از آسیب های

۴. سطح چهارم

۳. سطح سوم

۲. سطح دوم

۱. سطح اول

با سخ صحيح شماره سوار

1	ج
2	د
3	ج
4	د
5	الف
6	ج
7	بـ
8	بـ
9	الف
10	بـ
11	بـ
12	د
13	بـ
14	بـ
15	بـ
16	ج
17	ج
18	ج
19	الف
20	بـ
21	بـ
22	بـ
23	ج
24	د
25	بـ
26	ج
27	بـ
28	ج
29	بـ
30	الف

1

1 - وسیله‌ای است در جهت تغییر زندگی معلولان برای استقلال بیشتر؟

۴. ارزیابی

۳. توان بخشی

۲. سبب شناسی

۱. طبقه‌بندی معلولیت

2

2 - کدام مورد اولین رشته گسترش یافته مربوط به توان بخشی است؟

۴. متخصص نخاع

۳. پزشکی

۲. ارتوپدی

۱. دندانپزشکی

3

3 - کدام توان بخشی عبارت است از مجموعه اقداماتی که منجر به جذب، استخدام و نگهداری معلول در شغل مناسب خواهد شد؟

۴. حرفة‌ای

۳. پزشکی

۲. روانی

۱. قلبی

4

4 - سازمان بهزیستی در ایران چه سالی تشکیل شد؟

۴. ۱۳۴۷

۳. ۱۳۵۸

۲. ۱۳۴۸

۱. ۱۳۵۵

5

5 - تعریف کدام گزینه عبارت است از: برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی.

۴. بیماری

۳. توان بخشی روانی

۲. سلامتی

۱. توان بخشی

6

6 - هرگونه فقدان یا ناهنجاری در زمینه جسمانی، روانی، عملکردی یا آناتومی انسان نامیده می‌شود.

۴. نقص

۳. ناتوانی

۲. معلولیت

۱. محدودیت

7

7 - در طبقه‌بندی معلولیت از دیدگاه توان بخشی "سالمندان" در کدام گروه قرار می‌گیرند؟

۴. معلولین ذهنی روانی

۳. معلولین روانی

۲. معلولین اجتماعی

۱. معلولین جسمی

8

8 - رابط گوش میانی و گوش داخلی کدام است؟

۴. دریچه بیضی

۳. لابیرنت

۲. غضروف‌ها

۱. استخوان رکابی

9

9 - به کسی که نسبت به بسامدهای مختلف شنیداری حساسی از نظر شدت در حدود ۷۱ تا ۹۰ دسی بل داشته باشد چه می‌گویند؟

۲. آسیب شنوایی عمیق رو به شدید

۱. آسیب شنوایی شدید

۴. آسیب شنوایی عمیق

۳. آسیب شنوایی متوسط

10 - کدام نوع نقص شنوایی زمانی اتفاق می افتد که سلولهای مویی حلزون ضایعه دیده باشد؟

۱. نقص شنوایی انتقالی

۲. نقص شنوایی حسی-عصبی

۳. نقص شنوایی مرکزی

۴. نقص شنوایی امیخته

11 - در کدام نوع آزمون شنوایی بیمار در انجام آزمون و نتیجه آزمون کمترین نقش را دارد؟

۱. شنوایی سنجی تن خالص

۲. شنوایی سنجی از طریق بازی

۳. شنوایی سنجی از طریق بازتاب ها

۴. شنوایی سنجی پاسخ برانگیخته

12 - کدام گزینه روش درمانی برای افراد کم شنوای حسی - عصبی در حد عمیق است؟

۱. سمعک

۲. کاشت حلزون

۳. مداخله زودهنگام

۴. تربیت شنوایی

13 - در ساختمان چشم یک لایه شفاف است که سطح داخلی پلکها و روی سفیدی کره چشم را می پوشاند؟

۱. صلبیه

۲. زجاجیه

۳. ملتجمه

۴. مشیمیه

14 - کدام قسمت چشم، رنگ چشم افراد را تعیین می کند؟

۱. قرنیه

۲. زجاجیه

۳. عدسی

۴. عنبریه

15 - کدام بیماری یک بیماری چشمی عفونی است که بر اثر آلودگی محیط و تماس آلودگی با چشم از طریق دست آلوده ایجاد

می شود؟

۱. تراخم

۲. اب سیاه

۳. اب مروارید

۴. دیابت

16 - دلیل تأخیر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با نارسایی بینایی کدام است؟

۱. تأخیر در تجربه حسی-حرکتی

۲. تأخیر در تجربه اکتسابی

۳. فرایند رمز گشایی کندتر

۴. فرایند رمز گشایی ندارند

17 - شایع ترین ناتوانی رشدی کدام است؟

۱. کم توانی ذهنی

۲. در خودمندگی

۳. کمبود توجه/بیش فعالی

۴. سندروم دان

۱۸ - اولین نظام طبقه بندی برای کم توان ذهنی (در سال ۱۹۰۰) که بر پایه سن عقلی است توسط چه کسی پیشنهاد شد؟

۴. اتکینسون

۳. گودارد

۲. فلیپ پینل

۱. مارگریت جانسون

۱۹ - کدام طبقه، ۱۲ درصد افراد مبتلا به کم توانی ذهنی را تشکیل می‌دهد؟

۲. کم توانی ذهنی متوسط

۴. کم توانی ذهنی شدید

۱. کم توانی ذهنی خفیف

۳. کم توانی ذهنی عمیق

۲۰ - کدام کم توانی ذهنی سرکوچک و مدور و چشم مورب دارند؟

۴. هیدروسفال

۳. سندرم دان

۲. آفازی

۱. فنیل کتونوری

۲۱ - کدام کم توانی ذهنی دارای موی بور، چشمان آبی روشن و هوش بهر ۵۰ تا ۷۰ هستند؟

۴. سندرم دان

۳. آفازی

۲. فنیل کتونوری

۱. میکروسفال

۲۲ - بیمار قادر به حفظ تعادل خود نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است؟

۲. شکاف در ستون فقرات

۱. ناتوانی حرکتی ترکیبی

۴. عدم تعادل مخچه ای

۳. حرکت غیر ارادی در تعادل

۲۳ - انزوای اجتماعی، رفتار کلیشه‌ای، نقایص زبانی از نشانه‌های کدام اختلال است؟

۴. صرع

۳. اختلال کمبود توجه

۲. آفازیا

۱. اختلال اتیسم

۲۴ - چه نسبتی از کودکان با اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در بزرگسالی نیز نشانه‌های بیماری را دارا هستند؟

۴. ۶۰ تا ۷۰ درصد

۳. ۴۰ تا ۵۰ درصد

۲. ۳۰ تا ۴۰ درصد

۱. ۲۰ تا ۳۰ درصد

۲۵ - عاملی همانند تنفس در خانواده می‌تواند شدت این اختلال را تغییر دهد اما فی نفسه علت این اختلال محسوب نمی‌شود؟

۲. کمبود توجه / بیش فعالی

۱. صرع

۴. ام اس

۳. آفازیا

۲۶ - در کدام نوع صرع شخص به مدت کوتاهی دچار فراموشی یا نوعی خلسه می‌گردد، شروع به تکلم نامفهوم می‌کند، علاوه

بر علائم حرکتی علائم روانی همانند گریه یا خنده شدید دیده می‌شود؟

۴. صرع روانی-حرکتی

۳. صرع کوچک

۲. صرع بزرگ

۱. صرع عمومی

- در کدام نوع ام اس حمله ناگهانی اتفاق می افتد، سپس تا حمله بعدی هیچگونه پیشرفت در بیماری ایجاد نمی شود؟ 27

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ۱. نوع عود کننده - فروکش کننده | ۲. نوع پیشروندہ - اولیه |
| ۳. نوع پیشروندہ - ثانویه | ۴. نوع پیشروندہ - عودکننده |

- علت کدام بیماری ویروس نقص ایمنی بدن است؟ 28

- | | |
|----------|----------|
| ۱. صرع | ۲. ایدز |
| ۳. ام اس | ۴. اتیسم |

- کدام اختلال با آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت ظاهر کرده و اغلب با توهمندی هذیان همراه است؟ 29

- | | |
|------------------|--------------------|
| ۱. اختلال شناختی | ۲. اختلال خلقتی |
| ۳. اسکیزوفرنی | ۴. اختلالات ساختگی |

- در کدام وضعیت روان پریشی، بیمار بسیار شاد، پرحرف، کم خواب و پرخور است؟ 30

- | | |
|-----------------|-----------|
| ۱. روان گسیختگی | ۲. اضطراب |
| ۳. توهمندی | ۴. شیدایی |

بيانات صحيحة
نمبرو سوار

1	ج
2	بـ
3	دـ
4	جـ
5	بـ
6	دـ
7	الفـ
8	دـ
9	الفـ
10	بـ
11	دـ
12	بـ
13	جـ
14	دـ
15	الفـ
16	جـ
17	الفـ
18	جـ
19	بـ
20	جـ
21	بـ
22	دـ
23	الفـ
24	دـ
25	بـ
26	دـ
27	الفـ
28	بـ
29	جـ
30	دـ

۱- کدام اختلال اغلب با توهمندی هذیان و اختلالات هیجانی همراه است؟

۴. دیلریوم

۳. اسکیزوفرنیا

۲. دمانس

۱. افسردگی

۲- فردی است که از روابط جنسی به عنوان حرفة دائمی استفاده می کند.

۴. روسپی

۲. ترنس سکشوال

۲. بیمار هویت جنسی

۱. پدوفیلی

۳- در کدام قسمت چشم رگ های خونی و گلبول های سفید به مقدار زیادی وجود دارد؟

۴. زجاجیه

۲. صلبیه

۲. شبکیه

۱. ملتحمه

۴- از برجسته ترین ویژگی های اختلال توجه کدام است؟

۲. بی قراری افراطی-توجه ضعیف

۱. بی تفاوتی-توجه ضعیف

۴. بی تفاوتی-توجه زیاد

۳. بی قراری افراطی-توجه زیاد

۵- فرآیندی متشکل از اقدامات هدفمند در قادرسازی شخص معلول به منظور دستیابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد

جسمی ذهنی و اجتماعی چه نام دارد؟

۴. هیچکدام

۳. معلولیت

۲. توانبخشی

۱. ناتوانی

۶- طبق نظام طبقه بندی کم توانی ذهنی گودارد افراد با سن عقلی ۷ تا ۱۰ سال را چه می نامند؟

۴. کالبو

۲. کندذهن

۲. ناقص العقل

۱. کودن

۷- شایع ترین رویداد ویروسی در میان نوزдан که می تواند به آسیب های شناوایی نیز منجر شود چیست؟

- | | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ۱. اتواسکلروزیس | ۲. التهاب گوش میانی | ۳. سپتو مگالوویروس | ۴. سرخچه مادرزادی |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|

۸- در کدام نوع صرع بیمار شعور و شناسایی خود را از دست می دهد؟

- | | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| ۱. صرع گفتاری | ۲. صرع کوچک | ۳. صرع بزرگ | ۴. صرع روانی حرکتی |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|

۹- کدام نقص شناوایی غیر قابل برگشت می باشد؟

- | | |
|----------------|-------------------------|
| ۱. نقص شناوایی | ۲. نقص شناوایی حسی-عصبی |
|----------------|-------------------------|

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ۳. نقص شناوایی انتقالی | ۴. نقص شناوایی غیر حضوری |
|------------------------|--------------------------|

۱۰- بیماری اتیسم در چه زمانی شروع می شود و بهترین زمان غربالگری اتیسم در چه سنی است؟

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ۱. قبل از سی ماهگی-دو سال اول | ۲. بعد از سی ماهگی-شش سالگی |
|-------------------------------|-----------------------------|

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ۳. در سی ماهگی-بدو تولد | ۴. بعد از سی و پنج ماهگی- بدoo تولد |
|-------------------------|-------------------------------------|

۱۱- اختلالی که در نتیجه کشمکش های روانی بوجود می آید و اختلال در کارکرد روانی جزئی می باشد چه نام دارد؟

- | | | | |
|----------------|-----------|---------|---------|
| ۱. روان نژنندی | ۲. اضطراب | ۳. هويت | ۴. خلقی |
|----------------|-----------|---------|---------|

۱۲- کدام گروه از زوانشناسان وسوس را نوعی غریزه واخورد و ناخودآگاه می دانند؟

- | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| ۱. رفتارگرها | ۲. روانکاوان | ۳. روانشناسان شناختی | ۴. انسان گراها |
|--------------|--------------|----------------------|----------------|

۱۳- کدام اختلال با آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت ها تظاهر پیدا می کند؟

- | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| ۱. اختلال خلقی | ۲. اختلال شیدایی | ۳. اختلال دو قطبی | ۴. اسکیزوفرنی |
|----------------|------------------|-------------------|---------------|

۱۴- پرهیز از تماس جسمی و انزوای اجتماعی از ویژگی های کدام اختلال است؟

۴. اسکیزوفرنیا

۳. شیدایی

۲. اتیسم

۱. روانپریشی

۱۵- تولد زودتر از چند هفتگی تولد زودرس نامیده می شود؟

۴۱.۴

۳۹.۲

۳۸.۲

۴۰.۱

۱۶- معلولیت های احساسی مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

۴. قلبی-عروقی

۳. حرکتی و اعصاب

۲. ذهنی روانی

۱. بینایی

۱۷- آب سیاه معمولاً از چه سنی آغاز می شود؟

۴. حدود ۳۵ سالگی

۳. بعد از ۳۵ سالگی

۲. ۳۵ سالگی

۱. قبل از ۳۵ سالگی

۱۸- اگر فردی میزان افت شنوایی او ۵۶-۷۰ دسی بل باشد در کدام گروه کم شنوایی قرار می گیرد؟

۴. خفیف

۳. متوسط

۲. متوسط رو به شدید

۱. شدید

۱۹- پیام های عصبی مربوط به بینایی به کدام بخش مغز فرستاده می شود؟

۴. پیش سری

۳. پس سری

۲. هیپوთalamوس

۱. لوپ گیجگاهی

۲۰- در صورتی که ضایعه در فواصل مهره های پشتی و پایین تر از گردن وارد شود فلجمی در کدام قسمت بدن بوجود می آید؟

۴. تنہ

۳. پاهای

۲. دست ها

۱. چهارستون بدن

۲۱- در کدام اختلال بیمار می تواند مطالب جدید بیاموزد ولی نمی تواند خاطرات مهم تشخیصی را به یاد بیاورد؟

- | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ۱. اختلال ساختگی | ۲. اختلال شبه چسمی | ۳. اختلال تجزیه ای | ۴. اختلال اضطرابی |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

۲۲- ترس و اضطراب جزء کدام اختلال لحاظ می گردد؟

- | | | | |
|--------------|----------------|------------------|----------------|
| ۱. روانپریشی | ۲. روان نژنندی | ۳. اختلال دوقطبی | ۴. اسکیزوفرنیا |
|--------------|----------------|------------------|----------------|

۲۳- کدام بخش چشم اثر مستقیمی بر بینایی و مثل اسکلت خارجی از چشم محافظت می کند؟

- | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|
| ۱. مشیمیه | ۲. شبکیه | ۳. ملتمه | ۴. صلبیه |
|-----------|----------|----------|----------|

۲۴- کدام گروه از آسیب دیدگان اجتماعی در نتیجه ناهنجاری های فرهنگی-تربیتی و وضع نامساعد خانوادگی دچار

انحرافات اخلاقی و رفتاری می شوند؟

- | | | | |
|---------------------|------------|--------------------|------------|
| ۱. محکومین دراز مدت | ۲. متکدیان | ۳. معلولان اجتماعی | ۴. معتادین |
|---------------------|------------|--------------------|------------|

شماره
سیار

1	ج
2	ب
3	ج
4	ج
5	ج
6	ج
7	ج
8	ج
9	ج
10	ج
11	ج
12	ج
13	ب
14	ج
15	ج
16	ب
17	ج
18	ج
19	ج
20	ج
21	ج
22	ج
23	ب
24	ج

۱- کدام اندام در گوش میانی قرار دارد؟

۴. مکانیزم دهليزی

۳. دریچه بیضی

۲. حلزون گوش

۱. استخوانچه ها

۲- فرد با اسیب شنوازی با شدت ۷۱ تا ۹۰ دسی بل در کدام درجه اسیب شنوازی قرار می گیرد؟

۴. عمیق

۳. شدید

۲. متوسط رو به شدید

۱. متوسط

۳- کدام نوع از نقص شنوازی با کاهش حساسیت همراه نیست؟

۲. نقص شنوازی حسی عصبی

۱. نقص شنوازی انتقالی

۴. نقص شنوازی مرکزی

۳. نقص شنوازی امیخته

۴- در سنجش شنوازی این ازمون توسط دستگاه شنوازی سنجی انجام می گیرد؟

۲. شنوازی سنجی از طریق بازتاب

۱. شنوازی سنجی پاسخ برانگیخته

۴. شنوازی سنجی گفتاری

۳. شنوازی سنجی تن خالص

۵- اولین اقدام پس از تشخیص معلولیت شنوازی کدام است؟

۴. مشاوره با والدین

۳. اموزش والدین

۲. تجویز سمعک

۱. مداخله پزشکی

۶- به اموزش کودکان کم شنوا در مدرسه عادی چه می گویند؟

۴. اموزش ترکیبی

۳. اموزش شفاهی

۲. اموزش فراگیر

۱. اموزش خاص

۷- کدام عضو دستگاه بینایی از ورود میکروبها و عوامل بیماری زا به قسمتهای عمقی چشم جلوگیری می کند؟

۴. مژه

۳. قرنیه

۲. ملتحمه

۱. پلک

۸- پرده نازک سیاه رنگ دور شبکیه چشم چه نام دارد؟

۴. شبکیه

۳. مشیمیه

۲. زجاجیه

۱. صلبیه

۹- افراد با جه میزانی از نقص بینایی نور برای آنان قابل رویت نیست؟

۴. دیربینا

۳. نیمه بینا

۲. نابینا

۱. نابینای مطلق

۱۰- افراد با چه میزان نقص بینایی با استفاده از وسائل کمک بینایی می توانند به بهره برادی نسبی برسند؟

۴. نابینای متوسط

۳. نابینا

۲. دیربینا

۱. نیمه بینا

- ۱۱- افراد با چه میزان نقص بینایی زاویه دید کمتر از ۲۰ درجه دارند؟
۱. نابینای مطلق
۲. نابینا
۳. نیمه بینا
۴. دیربینا
- ۱۲- کلامی گرایی در افراد با نارسایی بینایی یعنی چه؟
۱. گفتار روان
۲. گفتار ناروان
۳. کاربرد واژه بدون فهم معنی
۴. نامحدودسازی معنی کلمات
- ۱۳- اثر کتاب بریل کدام گزینه است؟
۱. کندی فرایند رمزگشایی
۲. سرعت در فرایند رمزگشایی
۳. فقدان مشکل در ساماندهی افکار برای انسانویسی
۴. سرعت در رمزگشایی برای خواندن
- ۱۴- آموزش تحرک و جهت یابی از نیازهای کدام گروه است؟
۱. افراد با نقص شنوایی
۲. افراد معلول جسمی
۳. افراد اتیسم
۴. افراد بانقص بینایی
- ۱۵- چند وجهی بودن ناتوانی به همراه محدودیت در رفتار انطباقی به کدام گروه مربوط است؟
۱. معلولیت جسمی حرکتی
۲. کم توانی ذهنی
۳. صرع
۴. معلولیت اجتماعی
- ۱۶- کدام گزینه به عوامل بعد از تولد کم توانی ذهنی مربوط است؟
۱. انوکسی
۲. یرقان
۳. دیابت
۴. اثر اشعه ایکس
- ۱۷- از نظر نمره هوشی افراد با کم توانی ذهنی متوسط دارای چه میزان نمره هوشی هستند؟
۱. ۲۰ تا ۳۴
۲. ۷۰ تا ۸۵
۳. ۵۰ تا ۶۹
۴. ۴۹ تا ۳۵
- ۱۸- کدام اختلال به اسیب منطقه بروکا و ورنیکه مغز مربوط است؟
۱. اختلال ویژه یادگیری
۲. اختلال ویژه خواندن
۳. فلچ مغزی
۴. افازی
- ۱۹- این گروه حرفه‌ای رابط معرفی مراجع به متخصصان است؟
۱. روانشناس
۲. مددکار
۳. کاردرومانگر
۴. معلم سیار
- ۲۰- فرد دارای این اختلال قادر به حفظ تعادل نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است؟
۱. فلچ مغزی
۲. شکاف ستون فقرات
۳. ضایعات نخاعی
۴. گوزپشتنی

۲۱- به وسائل کمکی برای جلوگیری از بد شکلی ها یا کمک به یک عضو معلول جسمی چه می گویند؟

۴. ویلچر

۳. کراج

۲. ارتز

۱. پروتز

۲۲- افراد با کدام اختلال از تماس چشمی اجتناب می کنند و انزوای اجتماعی نشان می دهند؟

۲. کمبود توجه / بیش فعالی

۱. فلج مغزی

۴. کمبود توجه

۳. اتیسم

۲۳- کدام اختلال، اختلال رشدی است؟

۲. اتیسم

۱. فلج مغزی

۴. صرع

۳. بیش فعالی / کمبود توجه

۲۴- طرفداران دیدگاه شناختی در سبب شناسی اتیسم بر کدام عامل تاکید می کنند؟

۲. عوامل زیست شیمیایی

۱. عوامل ژنتیکی

۴. عوامل اجتماعی

۳. عوامل کارکرد اجرایی و نظریه ذهن

۲۵- پیامد رفتار تکانشی از کدام اختلال است؟

۲. اتیسم

۱. کمبود توجه / بیش فعالی

۴. ام اس

۳. صرع

۲۶- در کدام نوع از صرع فرد بدنش سفت شده و فریادی نامفهوم از گلوی او خارج می گردد؟

۴. صرع متوسط

۳. صرع کوچک

۲. صرع روانی حرکتی

۱. صرع بزرگ

۲۷- این اختلال با شروع معمولاً کند و مشکلات حسی مختلف به همراه است؟

۴. ام اس

۳. صرع

۲. بیش فعالی

۱. اتیسم

۲۸- در کدام اختلال بیمار قادر نیست خاطرات مهم تشخیصی را به خاطر اورد؟

۴. اختلال هویتی

۳. اختلالات شبه جسمی

۲. اختلالات تجزیه ای

۱. اختلالات ساختگی

۲۹- محکومین دراز مدت زندانها در کدام طبقه معلولین قرار می گیرند؟

۴. معلولان اجتماعی

۳. معلولان مذهبی

۲. معلولان اخلاقی

۱. معلولان حقوقی

-۳۰- برجسته ترین ویژگی کدام اختلال بی قراری افراطی است ؟

- ۱. اختلال اتیسم
- ۲. اختلال خلقی
- ۳. اختلال اضطرابی
- ۴. اختلال تجزیه ای

نمبر سون	پاسخ صحیح	نک
1		نک
2		نک
3		نک
4		نک
5		نک
6		نک
7		نک
8		نک
9		نک
10		نک
11		نک
12		نک
13		نک
14		نک
15		نک
16		نک
17		نک
18		نک
19		نک
20		نک
21		نک
22		نک
23		نک
24		نک
25		نک
26		نک
27		نک
28		نک
29		نک
30		نک

۱- اولین رویکرد روان درمانی از کیست ؟

۱. فلیپ پینل

۲. امیل کروب لین

۳. چارکوت

۴. زیکموند فروید

۲- اولین دوره آموزش فیزیوتراپی در ایران از کیست ؟

۱. مارگریت جانسون

۲. کن راد

۳. دکتر راسک

۴. دکتر چارکوت

۳- در اصطلاح شناسی "ایجاد نارسایی ها در سطح ارگانیک" چه نامیده می شود ؟

۱. بیماری

۲. ناتوانی

۳. نقص

۴. معلولیت

۴- در طبقه بندی معلولیت از دیدگاه توانبخشی دیربینایان در کدام طبقه قرار دارد ؟

۱. معلولین جسمی

۲. معلولین اجتماعی

۳. معلولین جسمی اجتماعی

۵- به فردی دارای نقص شنوازی متوسط گفته می شود که نسبت به بسامدهای مختلف شنیداری از نظر شدت از چه میزان حساسیتی برخوردار باشد ؟

۴. ۵۶ تا ۷۰ دسی بل

۳. ۴۱ تا ۵۵ دسی بل

۲. ۲۶ تا ۴۰ دسی بل

۱. ۵۱ تا ۶۵ دسی بل

۶- در ادراک شنوازی مایعات حلزون گوش بر کدام عضو اثر می گذارد ؟

۱. مغز

۲. استخوانچه ها

۳. عصب شنوازی

۴. سلولهای مویی

۷- کدام بیماری موثر بر اسیب شنوازی به مستعد ارثی بودن شناخته می شود ؟

۱. سیتومگالو

۲. اتو اسکلروزیس

۳. سرخجه مادرزادی

۴. محملک

۸- کدام نوع نقص شنوازی غیر قابل برگشت است ؟

۱. نقص شنوازی مرکزی

۳. نقص شنوازی انتقالی

۲. نقص شنوازی امیخته

۴. نقص شنوازی حسی - عصبی

۹- در کاشت حلزونی برای افراد ناشنوا بخش خارجی چه نام دارد ؟

۱. پروتز کاشت

۲. پردازشگر گفتار

۳. الکترودها

۴. میکروفون

۱۰- کدام اقدام توان بخشی معلولان شنایی به پذیرش معلولیت برمی گردد؟

۲. تجویز به موقع سمعک

۴. آموزش گفتار

۱. آموزش والدین

۳. مشاوره با والدین

۱۱- در دستگاه بینایی، ساختمان شفاف در پشت عنایی که در متمرکز کردن پرتوهای نور کمک می کند، چه نام دارد؟

۴. صلبیه

۳. مشیمیه

۲. زجاجیه

۱. عدسی

۱۲- کدام بیماری دستگاه بینایی بر اثر الودگی محیطی و تماس آلودگی با چشم از طریق دست آلوده یا حشرات به وجود می آید؟

۲. اب سیاه

۱. تراخم

۴. اسیب دیدگی اندام بینایی در اثر مسمومیت دارویی

۳. اب مروارید

۱۳- مهارت عصازنی، دنبال کردن، حرکت مستقل در محیط های آشنا و جستجوی اشیای بر زمین افتاده در افراد کم بینا یا نابینا به کدام برنامه توان بخشی مربوط است؟

۴. تربیت حواس

۳. تحرک و جهت یابی

۲. مهارت روزمره زندگی

۱. تحریک بینایی

۱۴- کودکان با کم توانی ذهنی خفیف در چه سطحی قرار می گیرند؟

۴. آموزش پذیر

۳. تربیت پذیر

۲. کودکان مرزی

۱. حمایت پذیر

۱۵- در طبقه بندی کم توانی ذهنی توسط گودارد، فرد با سن عقلی کمتر از سه سال چه نامیده می شود؟

۴. عقب مانده

۳. کندذهن

۲. ناقص العقل

۱. کودن

۱۶- وسیع ترین گروه کم توان ذهنی کدام است؟

۲. کم توانی ذهنی متوسط

۱. کم توانی ذهنی خفیف

۴. کم توانی ذهنی عمیق

۳. کم توانی ذهنی شدید

۱۷- کدام گروه از افراد کم توان ذهنی، سر کوچک، چشم های مورب، عقب سر پهن و انگشت دست کوتاه هستند؟

۴. سندروم دان

۳. فنیل کتونوری

۲. میکروسفال

۱. هیدروسفال

۱۸- کدام کم توانی ذهنی ناشی از اختلال سوخت و ساز مواد پروتئینی است؟

۴. افازی

۳. هیدروسفال

۲. فنیل کتونوری

۱. سندروم دان

۱۹- در کدام نارسایی جسمی- حرکتی، فرد دچار تغییر شکل اندام حرکتی است؟

۴. گوزپشته

۳. فلج پا

۲. قطع اندام تحتانی

۱. فلج یک طرف بدن

۲۰- در کدام اختلال فرد قادر به حفظ تعادل نیست؟

۲. ضایعات نخاعی

۴. شکاف در ستون فقرات

۱. قطع عضو

۳. ضایعات مخچه ای

۲۱- کدام وسیله توان بخشی معلولان جسمی - حرکتی برای استفاده اندام های فوقانی است؟

۴. ارتز

۳. کراج

۲. ویلچر

۱. واکر

۲۲- در سبب شناسی اتیسم کدام تبیین قدیمی تر است؟

۲. نظریه ذهن

۱. والدین سرد و طرد کننده

۴. بدکاری مغز

۳. دیدگاه شناختی

۲۳- کدام اختلال، مشکل عملکردی شناخته می شود؟

۲. ام اس

۱. اتیسم

۴. کمبود توجه/ابیش فعالی

۳. صرع

۲۴- کدام گزینه بیماری مزمن دستگاه اعصاب مرکزی است؟

۴. صرع

۳. مولتیپل اسکلروزیس

۲. اتیسم

۱. ایدز

۲۵- تب شدید و اسهال شدید بیش از یک ماه، برفک و تبخال از نشانه های کدام بیماری است؟

۴. صرع بزرگ

۳. ام اس پیشروندۀ

۲. ایدز

۱. ام اس عودکننده

۲۶- در کدام نوع صرع شخص به مدت کوتاهی دچار فراموشی یا نوعی خلسه می شود؟

۴. صرع بزرگ

۳. صرع ناگهانی

۲. صرع روانی- حرکتی

۱. صرع کوچک

۲۷- کدام اختلال اغلب با هذیان و توهمند همراه است؟

۲. اختلالات مربوط به مواد

۱. اسکیزوفرنی

۴. اختلالات ساختگی

۳. اختلالات شخصیت

۲۸- ترس و وسواس جزء کدام اختلال است؟

۱. اختلال مربوط به رشد ۲. روان گسیختگی ۳. روان پریشی ۴. روان نژنده

۲۹- بر اساس آمار بین المللی در هر جامعه ای چند درصد از مردم دچار انواع اختلالات روانی هستند؟

۱. ۱۸ درصد ۲. ۱۵ درصد ۳. ۲۵ درصد ۴. ۲۰ درصد

۳۰- کدام دارو ضد اضطراب است؟

۱. انتی هیستامین ۲. سیپریدون ۳. متادون ۴. انتی کواینرژیک

نهره سوار ياسع صحيح

١	د
٢	الف
٣	ح
٤	الف
٥	ح
٦	د
٧	ب
٨	د
٩	ب
١٠	ح
١١	الف
١٢	الف
١٣	ح
١٤	د
١٥	الف
١٦	الف
١٧	د
١٨	ب
١٩	د
٢٠	ح
٢١	ح
٢٢	الف
٢٣	د
٢٤	ح
٢٥	ب
٢٦	ب
٢٧	الف
٢٨	د
٢٩	ح
٣٠	الف

۱- هدف نهایی فرایند توانبخشی چیست؟

۴. سلامت جسمی

۳. پیشگیری

۲. درمان

۱. توانمندسازی

۲- کدام نوع توانبخشی به طور مستقل مطرح نشده است؟

۴. حرفه ای

۳. پزشکی

۲. روانی

۱. اجتماعی

۳- کدام حیطه توانبخشی جزء حیطه های نوین توانبخشی محسوب می شود؟

۴. قلبی

۳. روانی

۲. حرفه ای

۱. آموزشی

۴- هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت هایی که در سطح طبیعی از هر انسانی انتظار می رود چه نامیده می شود؟

۴. کم توانی

۳. معلولیت

۲. ناتوانی

۱. نقص

۵- طبق طبقه بندی توانبخشی، سالمدان جزء کدام گروه از معلولین محسوب شده اند؟

۴. سنی

۳. اجتماعی

۲. ذهنی - روانی

۱. جسمی

۶- کدام جزء گوش از نظر شنیدن کمترین اهمیت را دارد؟

۴. حلزون گوش

۳. موم گوش

۲. لاله گوش

۱. غشای صماخی

۷- مهمترین اندام موثر در شنیدن کدام است؟

۴. پرده صماخ

۳. لابیرنت

۲. استخوان چکشی

۱. حلزون گوش

۸- کدام نقص شنوایی غیر قابل برگشت است؟

۴. حسی- عصبی

۳. مرکزی

۲. آمیخته

۱. انتقالی

۹- بهترین راهکار برای پیشگیری از معلولیت شنوایی چیست؟

۲. تجویز به موقع سمعک

۴. مشاوره با والدین

۱. تشخیص زودرس

۳. مداخله روانی- اجتماعی

۱۰- فرصت دریافت مواد آموزشی ویژه و برنامه های توانبخشی بر اساس کدام تعریف توانبخشی معلولان بینایی مشخص می شود؟

۲. تعریف قانونی

۱. تعریف اجتماعی

۴. تعریف جامعه سناختی

۳. تعریف آموزشی

۱۱- ابتلا به بیماری تراخم در حوزه کدام دسته از افراد با نیازهای خاص مطرح شده است؟

۴. بینایی

۳. عصبی-حسی

۲. جسمی-حرکتی

۱. شنوایی

۲

۲. مازهای لابیرنت

۱. تابلوی اسنلن

۴. آزمون خطای ادراک-دیداری

۳. آزمون بندر گشتالت

۱۲- ساده ترین و رایج ترین ابزار ارزیابی تیزی دیداری کدام است؟

۴. بویایی

۳. لامسه

۲. دیداری

۱. شنیداری

کدام گزینه جزء اهداف عینی موسیقی درمانی در نابینایان نمی باشد؟

۲. ارتقای مهارت های ارتباطی

۱. کاهش ناسازگاری

۴. مشارکت فعال افراد در رشد و تحول جامع

۳. تحریک خلاقیت و تصویر سازی

۱۳- شایع ترین ناتوانی رشدی چیست؟

۲. نابینایی

۱. کم توانی هوشی

۴. معلولیت حسی-حرکتی

۳. ناشنوایی

۱۴- "پیوستگی و عمق" جزء کدام سطح از سیستم حمایتی توانبخشی معلولان ذهنی می باشد؟

۴. گسترده

۳. فراگیر

۲. محدود

۱. متناوب

۱۵- این بیماری به علت "از دیاد ترشح مایع مغزی نخاعی یا عدم امکان جریان و جذب آن در بطن های مغزی" ایجاد می شود؟

۴. میکروسفالی

۳. فنیل کتونوری

۲. هیدروسفالی

۱. ماکروسفالی

۱۸- در توانبخشی معلولان ذهنی، هدف نهایی کار درمانگران ایجاد چگونه عملکردهایی است؟

۴. رفتاری

۳. شناختی

۲. کارکردی

۱. ساختاری

۱۹- در روش یکپارچگی حسی "جین آیرز" بر کدام حس تاکید شده است؟

۴. دهليزی

۳. بویایی

۲. شنیداری

۱. دیداری

۲۰- متداول ترین نارسایی ناتوانی ساز دائمی از هنگام تولد کدام است؟

۴. ضایعات نخاعی

۳. سکته مغزی

۲. فلچ مغزی

۱. شکاف ستون فقرات

۲۱- برای جلوگیری از بدشکلی ها و یا تصحیح آن ها و تشییت قسمت های مختلف بدن به کار می رود؟

۴. واکر

۳. ارتز

۲. کراج

۱. پروتز

۲۲- عصای زیر بغل، عصای آرنجی و عصاهای دستی کدام دسته از وسایل توانبخشی معلولان جسمی- حرکتی است؟

۴. پروتز

۳. ارتز

۲. کraj

۱. واکر

۲۳- در این نوع صرع، تشخیص برای مدت کوتاهی دچار فراموشی یا نوعی حالت خلسه می شود؟

۴. صرع روانی- حرکتی

۳. صرع ناشناخته

۲. صرع کوچک

۱. صرع بزرگ

۲۴- بیماران مبتلا به این نوع "ام. اس" دچار حملاتی می شوند که فقط باعث از دست رفتن بینایی و یا حس های دیگر شان می شود؟

۴. پیشرونده- اولیه

۳. پیشرونده- ثانویه

۲. حسی خوش خیم

۱. پیشرونده- اولیه

۲۵- افراد مبتلا به کدام بیماری خاص مجموعه ای از بیماری ها را بصورت مرحله ای طی می کنند؟

۴. اتیسم

۳. ایدز

۲. فنیل کتونوری

۱. ام. اس

۲۶- "دمانس و روان آشفتگی" جزء کدام دسته از اختلالات است؟

۲. شناختی

۱. مربوط به رشد

۴. ناشی از مشکلات طبی عمومی

۳. مرتبط با مواد

۲۷- وجود رابطه صحیح بین والدین- فرزندان و انجام به موقع واکسیناسیون" جزو کدام سطح پیشگیری ها می باشد؟

۴. روانی- عاطفی

۳. ثالث

۲. ثانویه

۱. اولیه

۲۸- سنگر اصلی کار با بیماران روانی کجاست؟

۱. مدرسه

۲. خانواده

۴. جامعه و گروه همسالان

۳. مراکز درمان روانی

۲۹- در کدام یک از سطوح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سعی بر جلوگیری از تشدید آسیب‌ها و کاهش تنש‌های آن در خانواده و جامعه است؟

۴. چهارم

۳. سوم

۲. دوم

۱. اول

۳۰- کدام دسته جزء معلولان اجتماعی محسوب نمی‌شوند؟

۴. افراد مبتلا به ایدز

۳. روسپی‌ها

۲. معتادین

۱. متکدیان

ياسخ صحيح نسخة سواب

١	الف
٢	بـ
٣	دـ
٤	بـ
٥	الف
٦	بـ
٧	الف
٨	دـ
٩	الف
١٠	بـ
١١	دـ
١٢	الف
١٣	الف
١٤	دـ
١٥	الف
١٦	هـ
١٧	بـ
١٨	بـ
١٩	دـ
٢٠	الف
٢١	هـ
٢٢	بـ
٢٣	دـ
٢٤	بـ
٢٥	هـ
٢٦	بـ
٢٧	الف
٢٨	بـ
٢٩	هـ
٣٠	دـ

۱- "پیشگیری از تشدید عوارض و مشکلات حاصل از عوامل ناتوان کننده" بر کدام مولفه توان بخشی دلالت دارد؟

- | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| ۱. تعریف توانبخشی | ۲. اهداف توانبخشی | ۳. حیطه های توانبخشی | ۴. تاریخچه توانبخشی |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|

۲- در ایران اولین قانون توانبخشی معلولان مربوط به چه سالی است؟

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| ۱. ۱۳۵۲ | ۲. ۱۳۶۱ | ۳. ۱۳۴۹ | ۴. ۱۳۴۷ |
|---------|---------|---------|---------|

۳- نخستین آمارگیری معلولین را چه کسی انجام داد؟

- | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------------|
| ۱. فلیپ پینل | ۲. کوبینگ | ۳. کن راد | ۴. مارگریت جانسن |
|--------------|-----------|-----------|------------------|

۴- در اصطلاحات مرتبط با معلولیت به "ایجاد نارسایی ها در سطح ارگانیک" چه گفته می شود؟

- | | | | |
|-----------|--------|------------|------------|
| ۱. بیماری | ۲. نقص | ۳. ناتوانی | ۴. معلولیت |
|-----------|--------|------------|------------|

۵- در ایران میزان شیوع معلولیت بدون احتساب معلولیت خفیف چند درصد است؟

- | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ۱. ۱/۴ تا ۵ درصد | ۲. ۷ تا ۱۰ درصد | ۳. ۵ تا ۷ درصد | ۴. ۶/۷ تا ۱۰ |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|

۶- در طبقه بندی معلولیت از دیدگاه توانبخشی، متکدیان در کدام گروه قرار می گیرند؟

- | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|
| ۱. معلولین جسمی | ۲. معلولین روانی | ۳. معلولین آسیب دیده | ۴. معلولین اجتماعی |
|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|

۷- در طبقه بندی آسیب شناویی، نقص با شدت ۱۶ تا ۲۵ دسی بل چه نامیده می شود؟

- | | | | |
|---------|----------|----------|---------------------|
| ۱. خفیف | ۲. مختصر | ۳. متوسط | ۴. متوسط رو به شدید |
|---------|----------|----------|---------------------|

۸- کدام نوع نقص شناویی اغلب با دارو یا عمل جراحی بر طرف می شود؟

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ۱. نقص شناویی مرکزی | ۲. نقص شناویی حسی-عصبی |
|---------------------|------------------------|

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ۳. نقص شناویی انتقالی | ۴. نقص شناویی آمیخته |
|-----------------------|----------------------|

۹- در کدام نوع آزمون شناویی هر گوش به طور مجزا مورد آزمون قرار می گیرد و پس از انجام آزمون و دریافت پاسخ های بیمار با "رسم مقادیر شدت در برابر مقادیر بسامد" نمودار شناویی حاصل می گردد؟

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ۱. شناویی سنجی پاسخ برانگیخته | ۲. شناویی سنجی از طریق بازنگاری |
|-------------------------------|---------------------------------|

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ۳. شناویی سنجی گفتاری | ۴. شناویی سنجی تن خالص |
|-----------------------|------------------------|

۱۰- بهترین راهکار پیشگیری از معلولیت شنوایی کدام است؟

۱. تجویز به موقع سمعک

۳. مشاوره با والدین

۲. تشخیص زودهنگام

۴. اموزش والدین

۴. کاشت حلزون

۳. بلندگو

۲. تقویت کننده

۱. میکروفون

۱۱- در کدام قسمت سمعک "انرژی صوتی به انرژی الکتریکی" تبدیل می شود؟

۴. زجاجیه

۳. عنبیه

۲. قرنیه

۱. ملتحمه

۱۲- قسمت شفاف جلوی کره چشم چه نام دارد؟

۴. عنبیه

۳. مشیمیه

۲. زجاجیه

۱. صلبیه

۱۳- پرده نازک سیاه رنگ دور شبکیه چشم چه نام دارد؟

۴. نابینای مطلق

۳. نیمه بینا

۲. دیربینا

۱. نابینا

۱۴- در نقص بینایی با قدرت دید بیشتر از بیست، هفتادم چه گفته می شود؟

۴. کم توانی ذهنی

۳. ناتوانی شنوایی

۲. نارسایی گفتاری

۱. ناتوانی یادگیری

۱۵- پیشرفت تحصیلی افراد با نارسایی بینایی اغلب به دانش اموزان کدام گروه دیگر شباخت دارد؟

۴. ناتوانی ذهنی

۳. ناتوانی شنوایی

۲. نارسایی گفتاری

۱. ناتوانی یادگیری

۲. تاخیر در تکلم

۴. درون سازی

۱. محدودسازی معانی کلمات و فقدان بسط افراطی

۳. نارسایی تولی صدا و اوا

۱۶- تعریف کدام ناتوانی بر چند وجهی بودن آن دلالت دارد؟

۲. ناتوانی شنوایی

۴. ناتوانی بینایی

۱. معلولیت جسمی - حرکتی

۳. کم توانی ذهنی

۱۷- اولین طبقه بندی کم توانی ذهنی از کیست؟

۴. کاتل

۳. کاپلان

۲. جین ایرز

۱. گودارد

۱۸- کدام نوع کم توانی ذهنی به دلیل اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی می باشد؟

۴. افازی

۳. فنیل کتونوری

۲. هیدروسفال

۱. سندروم دان

-۲۰- کدام گروه کم توانی ذهنی در سنین پیش دبستانی قادر به صحبت کردن هستند و در سنین دبستانی پیشرفت تحصیلی انها تا کلاس دوم است ؟

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ۱. کم توانی ذهنی خفیف | ۲. کم توانی ذهنی شدید |
| ۳. کم توانی ذهنی فراگیر | ۴. کم توانی ذهنی متوسط |

-۲۱- در معلولیت جسمی - حرکتی اگر تغییر شکل به سمت راست یا چپ(طرفین) باشد، چه نامیده می شود ؟

- | | |
|------------|-------------|
| ۱. لوردوز | ۲. خمیدگی |
| ۳. گوزپشتی | ۴. اسکولیوز |

-۲۲- کدام معلولیت جسمی - حرکتی علاوه بر ناتوانی حرکتی ، توانمندی حسی ، شناختی و حساسیت هیجانی همراه با کارکرد حرکتی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ۱. فلچ مغزی | ۲. ضایعات نخاعی |
| ۳. شکاف در ستون فقرات | ۴. نقص عضوی |

-۲۳- در معلولیت جسمی - حرکتی به وسایل کمکی که برای جلوگیری از بدشکلی ها و یا تصحیح آنها به کار گرفته می شود ، چه می گویند ؟

- | | |
|---------|----------------|
| ۱. ارتز | ۲. پروتز |
| ۳. کراج | ۴. وسایل حرکتی |

-۲۴- باور سنتی در سبب شناسی اتیسم در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ کدام مورد است ؟

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ۱. دیدگاه اختلال در کارکرد شناختی | ۲. دیدگاه بدکاری مغز |
| ۳. دیدگاه ژنتیکی اختلال | ۴. دیدگاه وجود والدین طرد کننده و سرد |

-۲۵- کدام اختلال به رفتار تکانشی و فاقد سازمان منجر می شود ؟

- | | |
|----------|-------------------------|
| ۱. اتیسم | ۲. کمبود توجه/بیش فعالی |
| ۳. صرع | ۴. ام اس |

-۲۶- در کدام نوع صرع شخص به مدت کوتاهی دچار نوعی خلسه می گردد و محیط اطراف در نظرش کمی محو و تاریک می اید و شروع به تکلم و صحبت نامفهوم می کند ؟

- | | |
|-------------|----------------------|
| ۱. صرع کوچک | ۲. صرع روانی - حرکتی |
| ۳. صرع بزرگ | ۴. صرع ادراکی |

-۲۷- به تصلب چندگانه عصبی چه می گویند ؟

- | | |
|---------|--------------|
| ۱. صرع | ۲. ام اس |
| ۳. ایدز | ۴. هیدروسفال |

۲۸- انحراف و یا نوعی دوری از راه اصلی و سرپیچی و تخلف از ارزش های موجود جامعه و عدم رعایت آنها در تعریف معلولیت اجتماعی مربوط به کدام تخصص زیر است ؟

۴. روانشناس

۳. حقوقدان

۲. علمای اخلاق

۱. مذهب

۲۹- در کدام اختلال بیمار قادر نیست خاطرات مهم تشخیصی را به خاطر اورد اما مطالب جدید را می تواند بیاموزد ؟

۴. اختلال ساختگی

۳. اختلال تجزیه ای

۲. اختلال شبه جسمی

۱. اختلال هویت

۳۰- کدام اختلال با نشانه کاهش وزن ۱۰ درصد به طور ناگهانی و اسهال شدید و مداوم بیش از یک ماه و تب زیاد به همراه است ؟

۴. ایدز

۳. ام اس عودکننده

۲. ام اس پیش رونده

۱. اتیسم

نهر ده سوار صحبة ماسن

۱	ب
۲	د
۳	ه
۴	ب
۵	الف
۶	د
۷	الف
۸	ه
۹	د
۱۰	ب
۱۱	الف
۱۲	ب
۱۳	ه
۱۴	ب
۱۵	الف
۱۶	الف
۱۷	ه
۱۸	الف
۱۹	ه
۲۰	د
۲۱	د
۲۲	الف
۲۳	الف
۲۴	د
۲۵	ب
۲۶	ب
۲۷	ب
۲۸	ب
۲۹	ه
۳۰	د

۱- کدام یک از گزینه های زیر جزء اهداف کلی در خصوص شخص آسیب دیده نمی باشد؟

۱. ارتقاء توانمندی های موجود

۲. کمک به سلامت روانی و اعتماد بنفس

۳. عدم بکارگیری فرد آسیب دیده در عملکردهایی واقعی

۴. پذیرش حق و حقوق شغلی افراد آسیب دیده برابر با سایرین

۲- بر طبق نتایج تحقیقات باستان شناسان تاریخچه توان بخشی از چه زمانی وجود داشته است؟

۱. ۵ هزار سال قبل از میلاد

۲. قرن ۱۹

۳. قرن ۱۷

۳- در قرن شانزدهم در کدام کشور افراد عقب مانده ذهنی را در قفس محبوس می کردند؟

۱. ایتالیا

۲. آلمان

۳. فرانسه

۴. آمریکا

۴- از بین رشته های مربوط به توانبخشی به احتمال زیاد اولین تخصصی که گسترش پیدا کرده کدام مورد است ؟

۱. ارتوپدی

۲. دندان پزشک

۳. فیزیوتراپی

۴. روان پزشکی

۵- هدف کدام حیطه توان بخشی فراهم نمودن شرایط ارتقای دانش و مهارت ها در قالب انتقال یافته ها و اطلاعات است؟

۱. پزشکی

۲. آموزشی

۳. اجتماعی

۴. حرفه ای

۶- کدام مورد جزء معلولیت های اجتماعی به شمار می روند؟

۱. نابینایان

۲. ناشنوایان

۳. سالمندان

۴. معتادان

۷- بر اساس جدول شدت صوت و طبقه بندی درجات آسیب شنوایی کدام مقدار شدت صوت (دسی بل) نشان دهنده درجات

آسیب شنوایی عمیق است؟

۱. کمتر از 25

۲. 41 الی 55

۳. 56 الی 70

۴. بیش از 90

۸- این نوع کم شنوایی غیر قابل برگشت است و اغلب گزارش شده که فرد مبتلا، صحبت دیگران را می شنود، ولی قادر به درک

آن نمی باشد؟

۱. نقص شنوایی انتقالی

۲. نقص شنوایی حسی - عصبی

۴. نقص شنوایی آمیخته

۳. نقص شنوایی مرکزی

۹- اولین و اساسی ترین آزمون اندازه گیری میزان شنوایی چه نام دارد؟

۲. شنوایی سنجی گفتاری

۱. شنوایی سنجی تن خالص

۴. شنوایی سنجی پاسخ برانگیخته

۳. شنوایی سنجی از طریق بازتاب ها

۱۰- مهمترین وجه تمایز انسان و حیوان در چیست؟

۴. دیدن

۳. سخنوری

۲. شنوایی

۱. بویایی

۱۱- در کدام شیوه از روش های ارتباط، هجی کردن با انگشتان دست، زبان اشاره، گفتار خوانی، تکلم و تقویت شنوایی به طور همزمان صورت می گیرد؟

۲. روش جامع

۱. روش شفاهی شنیداری

۴. روش بکارگیری تقویت کننده ها

۳. روش هجی کردن با انگشتان

۱۲- روش بریل در کمک به کدام نقص افراد به کار بردہ می شود؟

۲. معلولیت ذهنی

۱. معلولیت شنوایی

۴. معلولین جسمی - حرکتی

۳. معلولیت بینایی

۱۳- کدام افراد از باقیمانده بینایی با استفاده از وسایل کمک بینایی، بهره برداری نسبی می نماید؟

۴. دیربینا

۳. نیمه بینا

۲. نابینا

۱. نابینای مطلق

۱۴- به طور متوسط کودکان با نارسایی بینایی از نظر پیشرفت تحصیلی چند سال از همسالان خود عقب تر هستند؟

۴. ۴

۳. ۳

۲. ۲

۱. ۱

۱۵- میزان شیوع کم توانی ذهنی در جامعه ایران چند درصد است؟

۴. ۳-۷

۳. ۳-۵

۲. ۱-۶

۱. ۱-۳

۱۶- بر مبنای کدام سیستم حمایتی به افرادی که شغلشان را از دست داده اند یا دارای بحران های وخیم پزشکی هستند کمک می شود؟

۴. فراگیر

۳. گستردہ

۲. محدود

۱. متناوب

۱۷- کدام طبقه از کودکان دارای معلولیت های ذهنی در سطح حمایت پذیر قرار دارند و بعضی از آن ها قادر به فراگیری بسیار محدود مراقبت از خود هستند؟

۴. عمیق

۳. شدید

۲. متوسط

۱. خفیف

۱۸- آموزش و رشد مهارت های خوردن، لباس پوشیدن و حفظ بهداشت فردی مربوط به کدامیک از مهارت های زیر در خصوص کودکان کم توان ذهنی است؟

۱. حرکتی ۲. اجتماعی ۳. مراقبت از خود ۴. ارتباطی

۱۹- کدام نوع از ناتوانی حرکتی نادر بوده و ممکن است به صورت انقباضی و حرکات غیرارادی با هم ایجاد شود؟

۱. انقباضی ۲. ترکیبی ۳. غیرارادی ۴. عدم تعادل مخچه ای

۲۰- ابتلای کودک به بیماری های میکروبی، مانند منزیت و یا بیماری های ویروسی همچون فلج اطفال مربوط به کدام نقیصه هستند؟

۱. مادرزادی ۲. دوران نوجوانی ۳. مراحل اولیه طفولیت ۴. دوران کودکی ثانویه

۲۱- جایگزینی عضوی مصنوعی برای عضو از دست رفته مانند دست یا پای مصنوعی چه نام دارد؟

۱. ارتز ۲. کراج ۳. وسیله ساده ۴. پروتز

۲۲- کدام بیماری به خواب و خیال در بیداری تعبیر شده است؟

۱. آتیسم ۲. بیش فعالی ۳. صرع ۴. ام اس

۲۳- در کدام صرع شخص مبتلا به یک باره بیهوش شده، محکم به زمین می خورد و بدنش سفت و سخت می شود؟

۱. بزرگ ۲. متوسط ۳. کوچک ۴. روانی - حرکتی

۲۴- در کدام نوع از بیماری ام اس، افراد دچار حملاتی می شوند که فقط باعث از دست رفتن بینایی و یا حس های دیگر آنها می شود، معمولاً این علایم موقتی بوده و خیلی به ندرت باعث بروز ناتوانایی های دائمی می شود؟

۱. پیش رونده اولیه ۲. پیش رونده ثانویه

۳. حسی خوش خیم ۴. پیش رونده عود کننده

۲۵- دلیریوم (روان آشتفتگی)، دمانس و فراموشی مربوط به کدام دسته از اختلالات روانی هستند؟

۱. مربوط به رشد ۲. شناختی ۳. ساختگی ۴. روان گسیختگی

۲۶- علایمی نظیر رنگ پریدگی پوست، چهره بیمناک، تهوع، لرزش، کاهش ترشح بزاق و تپش تند ضربان قلب مربوط به کدام پاسخ ترس است؟

۱. شناختی ۲. هیجانی ۳. رفتاری ۴. بدنی

۴۷- کدام اختلال با دامنه‌ای از نشانه‌ها مشخص می‌شود و با اختلال شدید در عملکرد همراه بوده و غالباً از نظر اجتماعی گوشی گیر و منزوی هستند؟

- | | | | |
|----------------|------------|----------------|--------------------|
| ۱. روان نژنندی | ۲. افسردگی | ۳. اسکیزوفرنیا | ۴. افسردگی دو قطبی |
|----------------|------------|----------------|--------------------|

۴۸- براساس کدام دیدگاه انحراف، رفتاری تبھکارانه محسوب می‌شود که خلاف موازین اجتماعی مورد قبول است و وجودش برای دوام نظام و ایجاد عدالت زیان بخش است؟

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| ۱. روان شناسان | ۲. علمای اخلاق | ۳. حقوق دانان | ۴. جامعه شناسان |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|

۴۹- کدام مورد پدیده‌ای اجتماعی است که هم بر سرنوشت فرد و هم کل جامعه اثر می‌گذارد، این افراد از طریق جلب ترحم دیگران به مال اندوزی می‌پردازند؟

- | | | | |
|------------|------------|------------------|-----------------|
| ۱. متکدیان | ۲. معتادان | ۳. کودکان بزهکار | ۴. کودکان فراری |
|------------|------------|------------------|-----------------|

۵۰- کدام مورد به عنوان آسیب مهم و اجتماعی مطرح بوده و حیات مادی و معنوی فرد و اجتماع را به خطر می‌اندازد؟

- | | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|
| ۱. تکدی گری | ۲. فحشا | ۳. دزدی | ۴. اعتیاد |
|-------------|---------|---------|-----------|

نحوه صحيح ياسع سوان

١	ج
٢	الف
٣	بـ
٤	الف
٥	بـ
٦	دـ
٧	دـ
٨	بـ
٩	الف
١٠	جـ
١١	بـ
١٢	جـ
١٣	دـ
١٤	بـ
١٥	الف
١٦	الف
١٧	دـ
١٨	هـ
١٩	بـ
٢٠	هـ
٢١	دـ
٢٢	الف
٢٣	الف
٢٤	هـ
٢٥	بـ
٢٦	دـ
٢٧	هـ
٢٨	دـ
٢٩	الف
٣٠	بـ

۱- هدف نهایی فرایند توانبخشی چیست؟

- | | | | |
|----------|----------------------|-----------|------------------|
| ۱. درمان | ۲. ارتقاء عملکرد فرد | ۳. اشتغال | ۴. تشکیل خانواده |
|----------|----------------------|-----------|------------------|

۲- کدامیک از رشته های پزشکی به عنوان اولین تخصص پزشکی مربوط به توانبخشی گسترش یافت؟

- | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| ۱. چشم پزشکی | ۲. فیزیوتراپی | ۳. ارتوپدی | ۴. کار درمانی |
|--------------|---------------|------------|---------------|

۳- برنامه آموزش امور خود یاری به عنوان توانبخشی آموزشی، به کدامیک از گروههای افراد معلول ارائه می گردد؟

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| ۱. ناشنوا | ۲. نابینا | ۳. کرولال | ۴. کم توان ذهنی |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|

۴- چرا ارائه خدمات توانبخشی باید در همه ابعاد روانی، جسمانی، اجتماعی و شغلی انجام پذیرد؟

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ۱. چون انتظارات جامعه زیاد است. | ۲. چون انسان موجودی چند جانبی است. |
|---------------------------------|------------------------------------|

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ۳. چون میزان معلولیت آنها شدید است. | ۴. چون انسان موجودی تک بعدی است. |
|-------------------------------------|----------------------------------|

۵- در چه سالی توان بخشی قلبی به صورت رسمی به عنوان بخشی از مراقبت های قلبی پذیرفته شد؟

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| ۱. 1959 | ۲. 1995 | ۳. 1987 | ۴. 1978 |
|---------|---------|---------|---------|

۶- مفهوم اختلال به کدام یک از مفاهیم زیر دلالت دارد؟

- | | | | |
|------------|------------|--------|------------|
| ۱. ناتوانی | ۲. معلولیت | ۳. نقص | ۴. محدودیت |
|------------|------------|--------|------------|

۷- معلولیت های احشایی در طبقه بندی معلولیت از دیدگاه پزشکی، شامل کدام معلولیت می باشد؟

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ۱. معلولیت های ناشی از معلولیت شنوایی | ۲. معلولیت های ناشی از معلولیت تنفسی |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ۳. معلولیت های ناشی از معلولیت صرع | ۴. معلولیت های ناشی از معلولیت بینایی |
|------------------------------------|---------------------------------------|

۸- مهمترین اندازه شنوایی در انسان کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| ۱. حلقه گوش | ۲. استخوان چکشی | ۳. استخوان سندانی | ۴. اندازه دهليزی |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------|

۹- فردی که میزان افت شنوایی او ۴۰-۲۶ دسیبل است در کدام گروه کم شنوایی قرار دارد؟

- | | | | |
|---------|----------|----------|--------------------|
| ۱. خفیف | ۲. مختصر | ۳. متوسط | ۴. متوسط روبه شدید |
|---------|----------|----------|--------------------|

۱۰- افرادی که به علت مشکلات عاطفی-روانی احساس کم شنوایی می کنند از کدام گروه از نقص شنوایی غیر عضوی هستند؟

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ۱. گروه اول | ۲. گروه دوم | ۳. گروه سوم | ۴. گروه چهارم |
|-------------|-------------|-------------|---------------|

- ۱۱- پیشگیری از نارسایی شناویی دغدغه اول کدام گروه از متخصصان محسوب می شود؟
۱. پزشک خانواده ۲. متخصص گوش ۳. شناویی سنج ۴. متخصص ژنتیک
- ۱۲- تقویت باقیمانده شناویی در کدام روش آموزش کودکان ناشناوا و کم شناور مورد تأکید قرار گرفته است؟
۱. روش زبان اشاره ۲. روش شفاهی - شنیداری ۳. روش هجی کردن با انگشتان
- ۱۳- قوی ترین راه ارتباطی موجود زنده با محیط، کدام یک از حواس پنج گانه است؟
۱. حس شناویی ۲. حس بینایی ۳. حس لامسه ۴. حس بویایی
- ۱۴- کدام یک از قسمت های چشم را می توان به پنجره تشبيه کرد؟
۱. مردمک ۲. عنیبه ۳. قرنیه ۴. عدسی
- ۱۵- تغییر در کدام قسمت چشم باعث حالت مگس پران در چشم می گردد؟
۱. قرنیه ۲. عدسی ۳. زجاجیه ۴. شبکیه
- ۱۶- کدام یک از بیماری های زیر، یک بیماری عفونی چشم است؟
۱. آب سیاه ۲. آب مروارید ۳. تراخم ۴. آستیگماتیسم
- ۱۷- کدام یک از موارد زیر در مورد کودکان نابینا صحیح می باشد؟
۱. در زمینه های هوشی تفاوتی با همسالان خود ندارند. ۲. کودکان نابینا در مرحله قان و قون صدای کمتری تولید می کنند. ۳. در یک دقیقه ۵ نفر در جهان به نابینایی مبتلا می گردد. ۴. کودکان نابینا توانایی تمیز ادرارکی کمی نسبت به همسالان خود دارند.
- ۱۸- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نارسایی بینایی به کدام گروه از دانش آموزان شباهت دارد؟
۱. دانش آموزان عقب مانده ذهنی ۲. دانش آموزان ناشناوا ۳. دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ۴. دانش آموزان مبتلا به اتیسم
- ۱۹- در بحث سبب شناسی کم توانی ذهنی، آنوكسی مربوط به کدامیک از عوامل زیر است؟
۱. عوامل قبل از حاملگی ۲. عوامل قبیل از تولد ۳. عوامل حین تولد ۴. عوامل بعد تولد

۲۰- گودارد، طبق نظام طبقه بندی بر پایه سن عقلی، سن عقلی افراد ناقص العقل را چند سال برآورد کرد؟

۱. ۳ سال ۲. اختلال شبه جسمانی ۳. کمتر از ۳ سال ۴. ۷ تا ۱۰ سال

۲۱- الگوی وراثت اختلال فنیل کتونوری کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۱. ژن غالب در کروموزوم های معمولی
۲. ژن غالب در کروموزوم های جنسی
۳. ژن مغلوب در کروموزوم های معمولی
۴. ژن مغلوب در کروموزوم های جنسی

۲۲- حرفه آموزی تخصصی مربوط به کدام مرحله توانبخشی حرفه ای افراد معلول می باشد؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. چهارم

۲۳- تغییر شکل اندام های حرکتی به سمت طرفین چه نامیده می شود؟

۱. پوکی استخوان ۲. لوردوز ۳. اسکولیوز ۴. گوزپشتی

۲۴- کدامیک از بیماری های زیر را به خواب و خیال بیداری تعبیر می کنند؟

۱. صرع ۲. کمبود توجه ۳. اتیسم ۴. ام اس

۲۵- رفتار تکانشی از ویژگی های کدام گروه از کودکان زیر می باشد؟

۱. فلچ اطفال ۲. کمبود توجه به همراه بیش فعالی ۳. اتیسم ۴. فلچ مغزی

۲۶- تخلیه ناگهانی انرژی الکتریکی سلول های مغزی مربوط به کدام بیماری می باشد؟

۱. تکانشی ۲. صرع ۳. اتیسم ۴. ام اس

۲۷- یکی از راه های اصلی انتقال ویروس ایدز کدام گزینه می باشد؟

۱. انتقال خون و فراورده های خونی ۲. اشک ، عرق ، عطسه ، سرفه
۳. دست دادن و درآغوش گرفتن ۴. دست زدن به وسایل فرد مبتلا

۲۸- تنها هدف آشکار بیماران مبتلا به اختلال ساختگی چیست؟

۱. کسب حس ترحم ۲. کسب درآمد ۳. ایفای نقش بیمار ۴. از زیر کار در رفتن

۲۹- توهם، هذیان و اختلالات هیجانی از نشانه های کدام بیماری هستند؟

۱. افسردگی دو قطبی ۲. اختلال شبه جسمانی ۳. اختلال ساختگی ۴. اسکیزوفرنیا

-۳۰- طرح اکرام ایتمام در چه سالی و توسط چه نهادی اجرا شده است؟

۱. ۱۳۷۷ - کمیته امداد امام خمینی (ره)

۲. ۱۳۷۳ - کمیته امداد امام خمینی (ره)

۳. ۱۳۷۷ - سازمان بهزیستی

ياسخ صحبي
نمره سوار

١	ج
٢	هـ
٣	د
٤	بـ
٥	لـ
٦	هـ
٧	بـ
٨	الفـ
٩	بـ
١٠	جـ
١١	دـ
١٢	لـ
١٣	لـ
١٤	هـ
١٥	هـ
١٦	هـ
١٧	لـ
١٨	هـ
١٩	هـ
٢٠	لـ
٢١	هـ
٢٢	لـ
٢٣	هـ
٢٤	لـ
٢٥	هـ
٢٦	لـ
٢٧	اللهـ
٢٨	هـ
٢٩	دـ
٣٠	بـ